

情報基礎数理学特選  
有限距離空間の離散幾何学とアルゴリズム  
(5) 線形方程式系の疎解

岡本 吉央

北陸先端科学技術大学院大学

2011年1月12日

”最終更新：2011/01/13 10:04”

- ① 線形方程式系の疎解
- ② 基底追跡
- ③ 基底追跡の理論的解析：制限付等長性
- ④ 基底追跡：補足

## この講義の主題

次の問題に対する考察

## 線形方程式系の疎解探索

入力

- ▶ 行列  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ , ベクトル  $b \in \mathbb{R}^m$ , 自然数  $r$

出力

- ▶ 方程式  $Ax = b$  の解  $x \in \mathbb{R}^n$  で  $|\text{supp}(x)| \leq r$  を満たすもの

定義：台


ベクトル  $x \in \mathbb{R}^n$  の台 (support) とは

$$\text{supp}(x) = \{i \in \{1, \dots, n\} \mid x_i \neq 0\}$$

のこと


## 例 1

- ▶  $n = 2, m = 1, r = 1$
- ▶ 方程式  $2x + 3y = 6$  の解で  $|\text{supp}((x, y))| \leq 1$  のもの



## 例 2

- ▶  $n = 3, m = 2, r = 2$
- ▶ 方程式  $6x + 3y + 2z = 12, y = 2$  の解で  $|\text{supp}((x, y, z))| \leq 2$  のもの



## どうしてこんな問題を考えるのか？


多くの応用があるから

- (1) 回帰分析
- (2) ノイズ除去
- (3) 圧縮センシング

注：これらの応用では、 $A, r$  を自分で決められる

# どうしてこんな問題を考えるのか？ (1) : 回帰分析 (1)

- ▶ ブラックボックス  $B: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  をモデル化して、推定したい



- ▶ モデル化 :  $B(x) = w^\top x + \varepsilon$  (線形モデル)
  - ▶  $w \in \mathbb{R}^n$  : 回帰係数
  - ▶  $\varepsilon \in \mathbb{R}$  : 誤差
- ▶ 推定 : 誤差 2 乗和最小化による  $w$  の推定 (最小 2 乗法)

$$\inf \sum_{i=1}^m (y_i - w^\top x_i)^2$$

- ▶ 次を満たす  $w$  が存在すれば、それは最適解
  - ▶ すべての  $i = 1, \dots, m$  に対して  $y_i = w^\top x_i$  (線形方程式系)

## どうしてこんな問題を考えるのか？ (1) : 回帰分析 (2)


- ▶ 「少ない変数による説明が望ましい」として最適化問題を変更  
( $r$  は適当に与える)

$$\inf \left\{ \sum_{i=1}^m (y_i - w^\top x_i)^2 \mid |\text{supp}(w)| \leq r \right\}$$

- ▶ つまり、次の2つの条件を満たす  $w \in \mathbb{R}^n$  が欲しい
  - ▶ すべての  $i = 1, \dots, m$  に対して  $y_i = w^\top x_i$  (線形方程式系)
  - ▶  $|\text{supp}(w)| \leq r$  (疎性)

## どうしてこんな問題を考えるのか？ (2) : ノイズ除去

## ▶ 観測データの通信



- ▶ ノイズに影響を受けた成分は少ないと仮定 ( $|\text{supp}(e)| \leq t$ )
- ▶ 受信データから送信データを復元 (誤り訂正)
  - ▶  $HG^\top = O$  となる行列  $H \in \mathbb{R}^{\ell \times n}$  を考える (検査行列)
  - ▶  $Hr = H(G^\top m + e) = HG^\top m + He = He$
- ▶ よって、次を満たす  $e$  が分かれば送信データ  $u$  を復元できる
  - ▶  $He = Hr$  (線形方程式系)
  - ▶  $|\text{supp}(e)| \leq t$  (疎性)

# どうしてこんな問題を考えるのか？ (3) : 圧縮センシング

## 圧縮センシング (compressed sensing) の問題設定

- ▶ 疎な信号  $x \in \mathbb{R}^n$  の観測 ( $|\text{supp}(x)| \leq r$ )
  - ▶ 普通の観測 :  $n$  個の成分を独立に観測
  - ▶ 「圧縮」観測 :  $k$  個のベクトル  $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{R}^n$  を用意して  
 $b_1 = a_1^\top x, \dots, b_k = a_k^\top x$  を観測
- ▶ 問題 :  $b_1, \dots, b_k$  から  $x$  が復元できるか？
- ▶ 復元した信号  $y \in \mathbb{R}^n$  が満たして欲しい条件
  - ▶ すべての  $i = 1, \dots, k$  に対して  $a_i^\top y = b_i$  (線形方程式系)
  - ▶  $|\text{supp}(y)| \leq r$  (疎性)

## 疎解探索問題の難しさ

## 線形方程式系の疎解探索

## 入力

- ▶ 行列  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ , ベクトル  $b \in \mathbb{R}^m$ , 自然数  $r$

## 出力

- ▶ 方程式  $Ax = b$  の解  $x \in \mathbb{R}^n$  で  $|\text{supp}(x)| \leq r$  を満たすもの

## 事実

(Garey, Johnson '79)

## 線形方程式系の疎解探索問題は NP 困難

⇨ ヒューリスティックなアルゴリズムを考える

- ① 線形方程式系の疎解
- ② 基底追跡
- ③ 基底追跡の理論的解析：制限付等長性
- ④ 基底追跡：補足

## 基底追跡

## 基底追跡 (basis pursuit, BP)

## 入力

- ▶ 行列  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ , ベクトル  $b \in \mathbb{R}^m$


## 問題

- ▶  $\inf\{\|x\|_1 \mid Ax = b\}$

これは線形計画問題であり (演習問題), 多項式時間で解ける


## 例 1


►  $\inf\{|x| + |y| \mid 2x + 3y = 6\}$



## 例 2

$$\blacktriangleright \inf\{|x| + |y| + |z| \mid 6x + 3y + 2z = 12, y = 2\}$$





- ▶ 詳細は後掲
- ▶  $n = 2000, r = 20$  : 固定
- ▶  $m = 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280$  : 変化
- ▶ 疎解と基底追跡の最適解の差 (ユークリッド距離) の平均をプロット

## 線形方程式系の疎解と基底追跡

## 例と計算機実験からの観察

- ▶ 2つの例では、基底追跡の最適解が疎解になっている
- ▶ 計算機実験では、 $m$ が小さくないとき、基底追跡の最適解が疎解になっている
- ▶ 計算機実験では、基底追跡の最適解が疎解ではないときもある

## 今から行うこと

- ▶ 基底追跡によって疎解が得られる場合がいつなのか、を考察する (理論的解析)

- ① 線形方程式系の疎解
- ② 基底追跡
- ③ 基底追跡の理論的解析：制限付等長性
- ④ 基底追跡：補足

## ここからの流れ

- ▶ 行列の制限付等長性 (RIP) を定義
- ▶ 次を証明 (詳細は後掲)
  - ▶  $A$  が RIP を満たす, かつ, 疎解が存在  
⇒ BP の最適解が疎解となる
  - ▶  $A$  が JL 補題の射影行列, かつ,  $m$  が小さくない  
⇒  $A$  が RIP を満たす

注 (再) : 先に見た応用では,  $A$  を自分で決められる

## 制限付等長性

$m, n, t$  : 自然数 ( $m \leq n, t \leq n$ )

定義：制限付等長性 (restricted isometry property, RIP)

行列  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  が  $t$ -制限付等長性 ( $t$ -restricted isometry property,  $t$ -RIP) を持つとは、

ある  $\varepsilon \geq 0$  が存在して、 $|\text{supp}(x)| \leq t$  を満たす任意の  $x \in \mathbb{R}^n$  に対して、

$$(1 - \varepsilon)\|x\|_2 \leq \|Ax\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|x\|_2$$

を満たすこと

このとき、 $\varepsilon$  を  $t$ -制限付等長定数 ( $t$ -restricted isometry constant) と呼ぶ

解釈：疎なベクトルに対して、 $A$  は  $l_2$ -ノルムをほとんど保存する

RIP  $\Rightarrow$  BP が疎解を与える

定理 5.1 (Candès, Tao '05, Rudelson, Vershynin '05, Donoho '06)

 $m, n, r$  : 自然数,  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ,  $b \in \mathbb{R}^m$  $A$  が  $3r$ -制限付等長性を持つ(定数は  $\varepsilon > 0$ ), かつ $Ax = b$  かつ  $|\text{supp}(x)| \leq r$  を満たすベクトル  $x \in \mathbb{R}^n$  が唯一に存在する $\Rightarrow$  その  $x$  は BP の唯一の最適解

## 定理 5.1 の証明 (1)

仮定は成り立つとする

- ▶  $x$  が BP の唯一の最適解ではないと仮定して矛盾を導く
- ▶  $y$  : BP の最適解 ( $x \neq y$ )
  - ▶  $Ax = b = Ay$
  - ▶  $\|x\|_1 \geq \|y\|_1$
- ▶  $e = y - x$  とする ( $e \neq 0$ )
  - ▶ 特に,  $Ae = A(y - x) = Ay - Ax = 0$  であり,  
ゆえに,  $\|Ae\|_2 = 0$
  - ▶ 最終的には,  $e \neq 0$  に矛盾することを導く

## 定理 5.1 の証明 (2)

## 主張 1

$$\sum_{i \in \text{supp}(x)} |e_i| \geq \sum_{i \notin \text{supp}(x)} |e_i|$$

証明 :

## 定理 5.1 の証明 (2)

## 主張 1

$$\sum_{i \in \text{supp}(x)} |e_i| \geq \sum_{i \notin \text{supp}(x)} |e_i|$$

証明 :  $\|x\|_1 \geq \|y\|_1$

## 定理 5.1 の証明 (2)

## 主張 1

$$\sum_{i \in \text{supp}(x)} |e_i| \geq \sum_{i \notin \text{supp}(x)} |e_i|$$

証明 :  $\|x\|_1 \geq \|y\|_1 = \|e + x\|_1$

## 定理 5.1 の証明 (2)

## 主張 1

$$\sum_{i \in \text{supp}(x)} |e_i| \geq \sum_{i \notin \text{supp}(x)} |e_i|$$

証明 :  $\|x\|_1 \geq \|y\|_1 = \|e + x\|_1$

$$= \sum_{i \in \text{supp}(x)} |e_i + x_i| + \sum_{i \notin \text{supp}(x)} |e_i| \quad (\because x_i = 0 \text{ for } i \notin \text{supp}(x))$$

## 定理 5.1 の証明 (2)

## 主張 1

$$\sum_{i \in \text{supp}(x)} |e_i| \geq \sum_{i \notin \text{supp}(x)} |e_i|$$

証明 :  $\|x\|_1 \geq \|y\|_1 = \|e + x\|_1$

$$= \sum_{i \in \text{supp}(x)} |e_i + x_i| + \sum_{i \notin \text{supp}(x)} |e_i| \quad (\because x_i = 0 \text{ for } i \notin \text{supp}(x))$$

$$\geq \sum_{i \in \text{supp}(x)} (|x_i| - |e_i|) + \sum_{i \notin \text{supp}(x)} |e_i| \quad (\because \text{三角不等式})$$

## 定理 5.1 の証明 (2)

## 主張 1

$$\sum_{i \in \text{supp}(x)} |e_i| \geq \sum_{i \notin \text{supp}(x)} |e_i|$$

証明 :  $\|x\|_1 \geq \|y\|_1 = \|e + x\|_1$

$$= \sum_{i \in \text{supp}(x)} |e_i + x_i| + \sum_{i \notin \text{supp}(x)} |e_i| \quad (\because x_i = 0 \text{ for } i \notin \text{supp}(x))$$

$$\geq \sum_{i \in \text{supp}(x)} (|x_i| - |e_i|) + \sum_{i \notin \text{supp}(x)} |e_i| \quad (\because \text{三角不等式})$$

$$= \sum_{i \in \text{supp}(x)} |x_i| - \sum_{i \in \text{supp}(x)} |e_i| + \sum_{i \notin \text{supp}(x)} |e_i|$$

## 定理 5.1 の証明 (2)

## 主張 1

$$\sum_{i \in \text{supp}(x)} |e_i| \geq \sum_{i \notin \text{supp}(x)} |e_i|$$

証明 :  $\|x\|_1 \geq \|y\|_1 = \|e + x\|_1$

$$= \sum_{i \in \text{supp}(x)} |e_i + x_i| + \sum_{i \notin \text{supp}(x)} |e_i| \quad (\because x_i = 0 \text{ for } i \notin \text{supp}(x))$$

$$\geq \sum_{i \in \text{supp}(x)} (|x_i| - |e_i|) + \sum_{i \notin \text{supp}(x)} |e_i| \quad (\because \text{三角不等式})$$

$$= \sum_{i \in \text{supp}(x)} |x_i| - \sum_{i \in \text{supp}(x)} |e_i| + \sum_{i \notin \text{supp}(x)} |e_i|$$

$$= \|x\|_1 - \sum_{i \in \text{supp}(x)} |e_i| + \sum_{i \notin \text{supp}(x)} |e_i| \quad (\because x_i = 0 \text{ for } i \notin \text{supp}(x))$$

□

## 定理 5.1 の証明 (3)

- ▶  $Z = \{1, \dots, n\} \setminus \text{supp}(x)$  とする ( $|Z| = n - |\text{supp}(x)| \geq n - r$ )
- ▶  $Z$  を  $k = \lceil (n - r)/2r \rceil$  個のブロック  $B_1, \dots, B_k$  に分割する
  - ▶  $|B_1| = \dots = |B_{k-1}| = 2r, |B_k| \leq 2r$
  - ▶  $i \in B_j, i' \in B_{j'}, j < j' \Rightarrow |e_i| \geq |e_{i'}|$

つまり,  $|e_i|$  が大きい方から順に  $2r$  個ずつ  $B_1, B_2, \dots$  に入れていき, 最終的な余りが  $B_k$  に入る

## 定理 5.1 の証明 (4)

## 主張 2

任意の  $j \in \{2, \dots, k\}$  に対して, 
$$\sqrt{\sum_{i \in B_j} |e_i|^2} \leq \frac{1}{\sqrt{2r}} \sum_{i' \in B_{j-1}} |e_{i'}|$$

証明 :  $j \in \{2, \dots, k\}$  を固定

## 定理 5.1 の証明 (4)

## 主張 2

任意の  $j \in \{2, \dots, k\}$  に対して, 
$$\sqrt{\sum_{i \in B_j} |e_i|^2} \leq \frac{1}{\sqrt{2r}} \sum_{i' \in B_{j-1}} |e_{i'}|$$

証明 :  $j \in \{2, \dots, k\}$  を固定

▶  $i \in B_j, i' \in B_{j-1} \Rightarrow |e_i| \leq |e_{i'}|$  ( $\because B_j$  の構成法)

## 定理 5.1 の証明 (4)

## 主張 2

任意の  $j \in \{2, \dots, k\}$  に対して, 
$$\sqrt{\sum_{i \in B_j} |e_i|^2} \leq \frac{1}{\sqrt{2r}} \sum_{i' \in B_{j-1}} |e_{i'}|$$

証明 :  $j \in \{2, \dots, k\}$  を固定

$$\blacktriangleright i \in B_j, i' \in B_{j-1} \Rightarrow |e_i| \leq |e_{i'}|$$

( $\because B_j$  の構成法)

$$\blacktriangleright |e_i| \leq \frac{1}{|B_{j-1}|} \sum_{i' \in B_{j-1}} |e_{i'}| = \frac{1}{2r} \sum_{i' \in B_{j-1}} |e_{i'}|$$

## 定理 5.1 の証明 (4)

## 主張 2

任意の  $j \in \{2, \dots, k\}$  に対して, 
$$\sqrt{\sum_{i \in B_j} |e_i|^2} \leq \frac{1}{\sqrt{2r}} \sum_{i' \in B_{j-1}} |e_{i'}|$$

証明 :  $j \in \{2, \dots, k\}$  を固定

▶  $i \in B_j, i' \in B_{j-1} \Rightarrow |e_i| \leq |e_{i'}|$  ( $\because B_j$  の構成法)

▶  $|e_i| \leq \frac{1}{|B_{j-1}|} \sum_{i' \in B_{j-1}} |e_{i'}| = \frac{1}{2r} \sum_{i' \in B_{j-1}} |e_{i'}|$

▶  $\sum_{i \in B_j} |e_i|^2 \leq \sum_{i \in B_j} \left( \frac{1}{2r} \sum_{i' \in B_{j-1}} |e_{i'}| \right)^2 \leq 2r \frac{1}{(2r)^2} \left( \sum_{i' \in B_{j-1}} |e_{i'}| \right)^2$  □

## 定理 5.1 の証明 (5)

## 主張 3

$$\sum_{j=2}^k \sqrt{\sum_{i \in B_j} |e_i|^2} \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\sum_{i' \in \text{supp}(x)} |e_{i'}|^2}$$

証明：

$$\sum_{j=2}^k \sqrt{\sum_{i \in B_j} |e_i|^2}$$

## 定理 5.1 の証明 (5)

## 主張 3

$$\sum_{j=2}^k \sqrt{\sum_{i \in B_j} |e_i|^2} \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\sum_{i' \in \text{supp}(x)} |e_{i'}|^2}$$

証明：

$$\sum_{j=2}^k \sqrt{\sum_{i \in B_j} |e_i|^2} \leq \sum_{j=2}^k \frac{1}{\sqrt{2r}} \sum_{i' \in B_{j-1}} |e_{i'}| \quad (\text{主張 2})$$

## 定理 5.1 の証明 (5)

## 主張 3

$$\sum_{j=2}^k \sqrt{\sum_{i \in B_j} |e_i|^2} \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\sum_{i' \in \text{supp}(x)} |e_{i'}|^2}$$

証明：

$$\begin{aligned} \sum_{j=2}^k \sqrt{\sum_{i \in B_j} |e_i|^2} &\leq \sum_{j=2}^k \frac{1}{\sqrt{2r}} \sum_{i' \in B_{j-1}} |e_{i'}| && \text{(主張 2)} \\ &\leq \frac{1}{\sqrt{2r}} \sum_{j=1}^k \sum_{i' \in B_j} |e_{i'}| \end{aligned}$$

## 定理 5.1 の証明 (5)

## 主張 3

$$\sum_{j=2}^k \sqrt{\sum_{i \in B_j} |e_i|^2} \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\sum_{i' \in \text{supp}(x)} |e_{i'}|^2}$$

証明：

$$\begin{aligned} \sum_{j=2}^k \sqrt{\sum_{i \in B_j} |e_i|^2} &\leq \sum_{j=2}^k \frac{1}{\sqrt{2r}} \sum_{i' \in B_{j-1}} |e_{i'}| && \text{(主張 2)} \\ &\leq \frac{1}{\sqrt{2r}} \sum_{j=1}^k \sum_{i' \in B_j} |e_{i'}| = \frac{1}{\sqrt{2r}} \sum_{i' \notin \text{supp}(x)} |e_{i'}| \end{aligned}$$

## 定理 5.1 の証明 (5)

### 主張 3

$$\sum_{j=2}^k \sqrt{\sum_{i \in B_j} |e_i|^2} \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\sum_{i' \in \text{supp}(x)} |e_{i'}|^2}$$

証明 :

$$\sum_{j=2}^k \sqrt{\sum_{i \in B_j} |e_i|^2} \leq \sum_{j=2}^k \frac{1}{\sqrt{2r}} \sum_{i' \in B_{j-1}} |e_{i'}| \quad (\text{主張 2})$$

$$\leq \frac{1}{\sqrt{2r}} \sum_{j=1}^k \sum_{i' \in B_j} |e_{i'}| = \frac{1}{\sqrt{2r}} \sum_{i' \notin \text{supp}(x)} |e_{i'}|$$

$$\leq \frac{1}{\sqrt{2r}} \sum_{i' \in \text{supp}(x)} |e_{i'}| \quad (\text{主張 1})$$

## 定理 5.1 の証明 (5)

## 主張 3

$$\sum_{j=2}^k \sqrt{\sum_{i \in B_j} |e_i|^2} \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\sum_{i' \in \text{supp}(x)} |e_{i'}|^2}$$

証明：任意の  $z \in \mathbb{R}^n$  に対して  $\|z\|_1 \leq \sqrt{n}\|z\|_2$  なので (演習問題),

$$\sum_{j=2}^k \sqrt{\sum_{i \in B_j} |e_i|^2} \leq \sum_{j=2}^k \frac{1}{\sqrt{2r}} \sum_{i' \in B_{j-1}} |e_{i'}| \quad (\text{主張 2})$$

$$\leq \frac{1}{\sqrt{2r}} \sum_{j=1}^k \sum_{i' \in B_j} |e_{i'}| = \frac{1}{\sqrt{2r}} \sum_{i' \notin \text{supp}(x)} |e_{i'}|$$

$$\leq \frac{1}{\sqrt{2r}} \sum_{i' \in \text{supp}(x)} |e_{i'}| \quad (\text{主張 1})$$

$$\leq \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\sum_{i' \in \text{supp}(x)} |e_{i'}|^2}$$

□

## 定理 5.1 の証明 (6)

- ▶ 添字集合  $X$  に対して、ベクトル  $e|_X \in \mathbb{R}^n$  を

$$(e|_X)_i = \begin{cases} e_i & (i \in X \text{ のとき}) \\ 0 & (\text{それ以外の場合}) \end{cases}$$

と定義すると、

- ▶  $e = \sum_{j=1}^k e|_{B_j} + e|_{\text{supp}(x)} = e|_{B_1 \cup \text{supp}(x)} + \sum_{j=2}^k e|_{B_j}$
- ▶  $\|e|_{B_j}\|_2^2 = \sum_{i \in B_j} |e_i|^2$

## 定理 5.1 の証明 (6)

- ▶ 添字集合  $X$  に対して、ベクトル  $e|_X \in \mathbb{R}^n$  を

$$(e|_X)_i = \begin{cases} e_i & (i \in X \text{ のとき}) \\ 0 & (\text{それ以外の場合}) \end{cases}$$

と定義すると、

- ▶  $e = \sum_{j=1}^k e|_{B_j} + e|_{\text{supp}(x)} = e|_{B_1 \cup \text{supp}(x)} + \sum_{j=2}^k e|_{B_j}$

- ▶  $\|e|_{B_j}\|_2^2 = \sum_{i \in B_j} |e_i|^2$

- ▶ このとき、主張 3 を言い換えると

$$\sum_{j=2}^k \|e|_{B_j}\|_2 \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \|e|_{\text{supp}(x)}\|_2$$

## 定理 5.1 の証明 (7)

$$0 = \|Ae\|_2 = \left\| A \left( e|_{B_1 \cup \text{supp}(x)} + \sum_{j=2}^k e|_{B_j} \right) \right\|_2$$

## 定理 5.1 の証明 (7)

$$0 = \|Ae\|_2 = \left\| A \left( e|_{B_1 \cup \text{supp}(x)} + \sum_{j=2}^k e|_{B_j} \right) \right\|_2$$

$$\geq \|A(e|_{B_1 \cup \text{supp}(x)})\|_2 - \sum_{j=2}^k \|A(e|_{B_j})\|_2 \quad (\text{三角不等式})$$

## 定理 5.1 の証明 (7)

$$\begin{aligned}
0 &= \|Ae\|_2 = \left\| A \left( e|_{B_1 \cup \text{supp}(x)} + \sum_{j=2}^k e|_{B_j} \right) \right\|_2 \\
&\geq \|A(e|_{B_1 \cup \text{supp}(x)})\|_2 - \sum_{j=2}^k \|A(e|_{B_j})\|_2 && \text{(三角不等式)} \\
&\geq (1 - \varepsilon) \|e|_{B_1 \cup \text{supp}(x)}\|_2 - \sum_{j=2}^k (1 + \varepsilon) \|e|_{B_j}\|_2 && \text{(A の } 3r\text{-制限付等長性)}
\end{aligned}$$

## 定理 5.1 の証明 (7)

$$\begin{aligned}
0 = \|Ae\|_2 &= \left\| A \left( e|_{B_1 \cup \text{supp}(x)} + \sum_{j=2}^k e|_{B_j} \right) \right\|_2 \\
&\geq \|A(e|_{B_1 \cup \text{supp}(x)})\|_2 - \sum_{j=2}^k \|A(e|_{B_j})\|_2 && \text{(三角不等式)} \\
&\geq (1 - \varepsilon) \|e|_{B_1 \cup \text{supp}(x)}\|_2 - \sum_{j=2}^k (1 + \varepsilon) \|e|_{B_j}\|_2 && \text{(A の } 3r\text{-制限付等長性)} \\
&\geq (1 - \varepsilon) \|e|_{B_1 \cup \text{supp}(x)}\|_2 - \frac{1 + \varepsilon}{\sqrt{2}} \|e|_{\text{supp}(x)}\|_2 && \text{(主張 3)}
\end{aligned}$$

## 定理 5.1 の証明 (7)

$$\begin{aligned}
0 = \|Ae\|_2 &= \left\| A \left( e|_{B_1 \cup \text{supp}(x)} + \sum_{j=2}^k e|_{B_j} \right) \right\|_2 \\
&\geq \|A(e|_{B_1 \cup \text{supp}(x)})\|_2 - \sum_{j=2}^k \|A(e|_{B_j})\|_2 && \text{(三角不等式)} \\
&\geq (1 - \varepsilon) \|e|_{B_1 \cup \text{supp}(x)}\|_2 - \sum_{j=2}^k (1 + \varepsilon) \|e|_{B_j}\|_2 && \text{(A の } 3r\text{-制限付等長性)} \\
&\geq (1 - \varepsilon) \|e|_{B_1 \cup \text{supp}(x)}\|_2 - \frac{1 + \varepsilon}{\sqrt{2}} \|e|_{\text{supp}(x)}\|_2 && \text{(主張 3)} \\
&\geq (1 - \varepsilon) \|e|_{\text{supp}(x)}\|_2 - \frac{1 + \varepsilon}{\sqrt{2}} \|e|_{\text{supp}(x)}\|_2
\end{aligned}$$

## 定理 5.1 の証明 (7)

$$\begin{aligned}
0 = \|Ae\|_2 &= \left\| A \left( e|_{B_1 \cup \text{supp}(x)} + \sum_{j=2}^k e|_{B_j} \right) \right\|_2 \\
&\geq \|A(e|_{B_1 \cup \text{supp}(x)})\|_2 - \sum_{j=2}^k \|A(e|_{B_j})\|_2 && \text{(三角不等式)} \\
&\geq (1 - \varepsilon) \|e|_{B_1 \cup \text{supp}(x)}\|_2 - \sum_{j=2}^k (1 + \varepsilon) \|e|_{B_j}\|_2 && \text{(A の } 3r\text{-制限付等長性)} \\
&\geq (1 - \varepsilon) \|e|_{B_1 \cup \text{supp}(x)}\|_2 - \frac{1 + \varepsilon}{\sqrt{2}} \|e|_{\text{supp}(x)}\|_2 && \text{(主張 3)} \\
&\geq (1 - \varepsilon) \|e|_{\text{supp}(x)}\|_2 - \frac{1 + \varepsilon}{\sqrt{2}} \|e|_{\text{supp}(x)}\|_2 \\
&= \left( 1 - \varepsilon - \frac{1 + \varepsilon}{\sqrt{2}} \right) \|e|_{\text{supp}(x)}\|_2
\end{aligned}$$

## 定理 5.1 の証明 (7)

$$\begin{aligned}
0 = \|Ae\|_2 &= \left\| A \left( e|_{B_1 \cup \text{supp}(x)} + \sum_{j=2}^k e|_{B_j} \right) \right\|_2 \\
&\geq \|A(e|_{B_1 \cup \text{supp}(x)})\|_2 - \sum_{j=2}^k \|A(e|_{B_j})\|_2 && \text{(三角不等式)} \\
&\geq (1 - \varepsilon) \|e|_{B_1 \cup \text{supp}(x)}\|_2 - \sum_{j=2}^k (1 + \varepsilon) \|e|_{B_j}\|_2 && \text{(A の } 3r\text{-制限付等長性)} \\
&\geq (1 - \varepsilon) \|e|_{B_1 \cup \text{supp}(x)}\|_2 - \frac{1 + \varepsilon}{\sqrt{2}} \|e|_{\text{supp}(x)}\|_2 && \text{(主張 3)} \\
&\geq (1 - \varepsilon) \|e|_{\text{supp}(x)}\|_2 - \frac{1 + \varepsilon}{\sqrt{2}} \|e|_{\text{supp}(x)}\|_2 \\
&= \left( 1 - \varepsilon - \frac{1 + \varepsilon}{\sqrt{2}} \right) \|e|_{\text{supp}(x)}\|_2 \geq 0 && (\because \varepsilon \text{ が十分小さい})
\end{aligned}$$

## 定理 5.1 の証明 (7)

$$\begin{aligned}
0 = \|Ae\|_2 &= \left\| A \left( e|_{B_1 \cup \text{supp}(x)} + \sum_{j=2}^k e|_{B_j} \right) \right\|_2 \\
&\geq \|A(e|_{B_1 \cup \text{supp}(x)})\|_2 - \sum_{j=2}^k \|A(e|_{B_j})\|_2 && \text{(三角不等式)} \\
&\geq (1 - \varepsilon) \|e|_{B_1 \cup \text{supp}(x)}\|_2 - \sum_{j=2}^k (1 + \varepsilon) \|e|_{B_j}\|_2 && \text{(A の } 3r\text{-制限付等長性)} \\
&\geq (1 - \varepsilon) \|e|_{B_1 \cup \text{supp}(x)}\|_2 - \frac{1 + \varepsilon}{\sqrt{2}} \|e|_{\text{supp}(x)}\|_2 && \text{(主張 3)} \\
&\geq (1 - \varepsilon) \|e|_{\text{supp}(x)}\|_2 - \frac{1 + \varepsilon}{\sqrt{2}} \|e|_{\text{supp}(x)}\|_2 \\
&= \left( 1 - \varepsilon - \frac{1 + \varepsilon}{\sqrt{2}} \right) \|e|_{\text{supp}(x)}\|_2 \geq 0 && (\because \varepsilon \text{ が十分小さい})
\end{aligned}$$

よって,  $\|e|_{\text{supp}(x)}\|_2 = 0$  (すなわち,  $e|_{\text{supp}(x)} = 0$ )

## 定理 5.1 の証明 (8)

$$0 = \|e|_{\text{supp}(x)}\|_1$$

## 定理 5.1 の証明 (8)

$$\begin{aligned} 0 &= \|e|_{\text{supp}(x)}\|_1 \\ &= \sum_{i \in \text{supp}(x)} |e_i| \end{aligned}$$

## 定理 5.1 の証明 (8)

$$\begin{aligned} 0 &= \|e|_{\text{supp}(x)}\|_1 \\ &= \sum_{i \in \text{supp}(x)} |e_i| \\ &\geq \sum_{i \notin \text{supp}(x)} |e_i| \end{aligned}$$

(主張 1)

## 定理 5.1 の証明 (8)

$$\begin{aligned} 0 &= \|e|_{\text{supp}(x)}\|_1 \\ &= \sum_{i \in \text{supp}(x)} |e_i| \\ &\geq \sum_{i \notin \text{supp}(x)} |e_i| && \text{(主張 1)} \\ &\geq 0 \end{aligned}$$

よって、 $e = 0$  となり、これは  $e \neq 0$  に矛盾 □

## ここからの流れ

- ▶ 行列の制限付等長性 (RIP) を定義 (済)
- ▶ 次を証明 (詳細は後掲)
  - ▶  $A$  が RIP を満たす, かつ, 疎解が存在  
⇒ BP の最適解が疎解となる (済)
  - ▶  $A$  が JL 補題の射影行列, かつ,  $m$  が小さくない  
⇒  $A$  が RIP を満たす

注 (再) : 先に見た応用では,  $A$  を自分で決められる

$A$  が JL 補題の行列, かつ,  $m$  が小さくない  $\Rightarrow A$  は RIP を満たす

$m, n$  : 自然数

定理 5.2 (Candès, Tao '05, Rudelson, Vershynin '05, Donoho '06)

設定 :

- ▶  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  : 各成分が独立に  $\mathcal{N}(0, 1)$  に従う
- ▶  $B = \frac{1}{\sqrt{m}}A$
- ▶  $\varepsilon > 0$  : 十分小さな定数
- ▶ ある定数  $C$  に対して,  $1 \leq r \leq n/C$  かつ  $m \geq Cr \ln \frac{n}{r}$

結論 :

- ▶  $\varepsilon$  のみに依存する定数  $c > 0$  が存在して

$$\Pr[B \text{ が } 3r\text{-制限付等長性 (定数は } \varepsilon) \text{ を満たす}] \geq 1 - \exp(-cm)$$

つまり, JL 補題で使われた行列は高い確率で制限付等長性を満たす

## JL 補題の証明で使った補題 (復習)

## 補題 4.1 の帰結

$\varepsilon$  のみに依存する定数  $c_0 > 0$  が存在して、  
任意の  $x \in \mathbb{R}^n$  に対して

$$\Pr[(1 - \varepsilon)\|x\|_2 \leq \|Bx\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|x\|_2] \geq 1 - \exp(-c_0 m)$$

## 証明すべきこと

$\varepsilon$  のみに依存する定数  $c > 0$  が存在して

$$\Pr \left[ \begin{array}{l} |\text{supp}(x)| \leq 3r \text{ を満たす任意の } x \text{ に対して} \\ (1 - \varepsilon)\|x\|_2 \leq \|Bx\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|x\|_2 \end{array} \right] \geq 1 - \exp(-cm)$$

- ▶ 「任意の  $x$  に対して」が確率の外にあるか中にあるか
- ▶ 疎性に関する条件がないかあるか

## 定理 5.2 の証明の流れ

## 証明の方針

- ▶ 「任意の  $x$  に対して」が確率の外にあるので、中に入れたい
- ▶ 「任意の  $x$ 」を「ある有限集合  $N$  の任意の要素  $x$ 」に変えたい
- ▶ これにより、合併上界 (union bound) が適用できるようになる

## 証明の流れ

- ① 有限稠密集合  $N$  を定義
- ② 空間全体  $\mathbb{R}^n$  と有限稠密集合  $N$  の関係を考察
- ③ 全体は、矛盾を導いて証明

## 有限稠密集合

定義：単位球面


$$S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|_2 = 1\} \subseteq \mathbb{R}^n$$

 $\delta > 0$  : 固定

定義：稠密集合

集合  $N \subseteq S^{n-1}$  が  $\delta$ -稠密 ( $\delta$ -dense) であるとは、

$$\forall x \in S^{n-1}, \exists y \in N: \|x - y\|_2 \leq \delta$$



## 有限稠密集合

定義：単位球面


$$S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|_2 = 1\} \subseteq \mathbb{R}^n$$

 $\delta > 0$  : 固定

定義：稠密集合

集合  $N \subseteq S^{n-1}$  が  $\delta$ -稠密 ( $\delta$ -dense) であるとは、

$$\forall x \in S^{n-1}, \exists y \in N: \|x - y\|_2 \leq \delta$$



## 有限稠密集合

定義：単位球面


$$S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|_2 = 1\} \subseteq \mathbb{R}^n$$

 $\delta > 0$  : 固定

定義：稠密集合

集合  $N \subseteq S^{n-1}$  が  $\delta$ -稠密 ( $\delta$ -dense) であるとは,

$$\forall x \in S^{n-1}, \exists y \in N: \|x - y\|_2 \leq \delta$$



有限稠密集合と  $(1 + \varepsilon)$ -埋め込み

## 補題 5.3

$\varepsilon > 0$  : 十分小さい,  $N \subseteq S^{n-1}$  :  $\varepsilon$ -稠密集合,  $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$

$$\forall y \in N: 1 - \varepsilon \leq \|By\|_2 \leq 1 + \varepsilon$$

$$\Downarrow$$

$$\forall x \in \mathbb{R}^n: (1 - 3\varepsilon)\|x\|_2 \leq \|Bx\|_2 \leq (1 + 3\varepsilon)\|x\|_2$$

証明 :

- ▶  $x \in S^{n-1}$  に対して証明すれば十分

有限稠密集合と  $(1 + \varepsilon)$ -埋め込み

## 補題 5.3

$\varepsilon > 0$  : 十分小さい,  $N \subseteq S^{n-1}$  :  $\varepsilon$ -稠密集合,  $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$

$$\forall y \in N: 1 - \varepsilon \leq \|By\|_2 \leq 1 + \varepsilon$$

$$\Downarrow$$

$$\forall x \in \mathbb{R}^n: (1 - 3\varepsilon)\|x\|_2 \leq \|Bx\|_2 \leq (1 + 3\varepsilon)\|x\|_2$$

証明 :

- ▶  $x \in S^{n-1}$  に対して証明すれば十分
  - ▶ そうできたとする

有限稠密集合と  $(1 + \varepsilon)$ -埋め込み

## 補題 5.3

$\varepsilon > 0$  : 十分小さい,  $N \subseteq S^{n-1}$  :  $\varepsilon$ -稠密集合,  $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$

$$\forall y \in N: 1 - \varepsilon \leq \|By\|_2 \leq 1 + \varepsilon$$

$$\Downarrow$$

$$\forall x \in \mathbb{R}^n: (1 - 3\varepsilon)\|x\|_2 \leq \|Bx\|_2 \leq (1 + 3\varepsilon)\|x\|_2$$

証明 :

- ▶  $x \in S^{n-1}$  に対して証明すれば十分
  - ▶ そうできたとする
  - ▶  $\tilde{x} \in \mathbb{R}^n$  に対して,  $\tilde{x}/\|\tilde{x}\|_2 \in S^{n-1}$

有限稠密集合と  $(1 + \varepsilon)$ -埋め込み

## 補題 5.3

$\varepsilon > 0$  : 十分小さい,  $N \subseteq S^{n-1}$  :  $\varepsilon$ -稠密集合,  $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$

$$\forall y \in N: 1 - \varepsilon \leq \|By\|_2 \leq 1 + \varepsilon$$

$$\Downarrow$$

$$\forall x \in \mathbb{R}^n: (1 - 3\varepsilon)\|x\|_2 \leq \|Bx\|_2 \leq (1 + 3\varepsilon)\|x\|_2$$

証明 :

- ▶  $x \in S^{n-1}$  に対して証明すれば十分
  - ▶ そうできたとする
  - ▶  $\tilde{x} \in \mathbb{R}^n$  に対して,  $\tilde{x}/\|\tilde{x}\|_2 \in S^{n-1}$
  - ▶  $(1 - 3\varepsilon)\|\tilde{x}/\|\tilde{x}\|_2\|_2 \leq \|B(\tilde{x}/\|\tilde{x}\|_2)\|_2 \leq (1 + 3\varepsilon)\|\tilde{x}/\|\tilde{x}\|_2\|_2$

有限稠密集合と  $(1 + \varepsilon)$ -埋め込み

## 補題 5.3

$\varepsilon > 0$  : 十分小さい,  $N \subseteq S^{n-1}$  :  $\varepsilon$ -稠密集合,  $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$

$$\forall y \in N: 1 - \varepsilon \leq \|By\|_2 \leq 1 + \varepsilon$$

$$\Downarrow$$

$$\forall x \in \mathbb{R}^n: (1 - 3\varepsilon)\|x\|_2 \leq \|Bx\|_2 \leq (1 + 3\varepsilon)\|x\|_2$$

証明 :

- ▶  $x \in S^{n-1}$  に対して証明すれば十分
  - ▶ そうできたとする
  - ▶  $\tilde{x} \in \mathbb{R}^n$  に対して,  $\tilde{x}/\|\tilde{x}\|_2 \in S^{n-1}$
  - ▶  $(1 - 3\varepsilon)\|\tilde{x}/\|\tilde{x}\|_2\|_2 \leq \|B(\tilde{x}/\|\tilde{x}\|_2)\|_2 \leq (1 + 3\varepsilon)\|\tilde{x}/\|\tilde{x}\|_2\|_2$
  - ▶  $(1 - 3\varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \leq \|B\tilde{x}\|_2 \leq (1 + 3\varepsilon)\|\tilde{x}\|_2$

## 補題 5.3 の証明 (続 1)

証明すること : 任意の  $x \in S^{n-1}$  に対して,  $\|Bx\|_2 \leq 1 + 3\varepsilon$

## 補題 5.3 の証明 (続 1)

証明すること : 任意の  $x \in S^{n-1}$  に対して,  $\|Bx\|_2 \leq 1 + 3\varepsilon$

▶  $M = \max\{\|Bx\|_2 \mid x \in S^{n-1}\}$  とする

## 補題 5.3 の証明 (続 1)

証明すること : 任意の  $x \in S^{n-1}$  に対して,  $\|Bx\|_2 \leq 1 + 3\varepsilon$

- ▶  $M = \max\{\|Bx\|_2 \mid x \in S^{n-1}\}$  とする
- ▶  $x_0 \in S^{n-1} : M = \|Bx_0\|_2$  を満たすとする

## 補題 5.3 の証明 (続 1)

証明すること : 任意の  $x \in S^{n-1}$  に対して,  $\|Bx\|_2 \leq 1 + 3\varepsilon$

- ▶  $M = \max\{\|Bx\|_2 \mid x \in S^{n-1}\}$  とする
- ▶  $x_0 \in S^{n-1} : M = \|Bx_0\|_2$  を満たすとする
- ▶  $y_0 \in N : \|x_0 - y_0\|_2 \leq \varepsilon$  を満たすとする

## 補題 5.3 の証明 (続 1)

証明すること : 任意の  $x \in S^{n-1}$  に対して,  $\|Bx\|_2 \leq 1 + 3\varepsilon$

- ▶  $M = \max\{\|Bx\|_2 \mid x \in S^{n-1}\}$  とする
- ▶  $x_0 \in S^{n-1} : M = \|Bx_0\|_2$  を満たすとする
- ▶  $y_0 \in N : \|x_0 - y_0\|_2 \leq \varepsilon$  を満たすとする
- ▶ 計算 :  $M = \|Bx_0\|_2$

## 補題 5.3 の証明 (続 1)

証明すること : 任意の  $x \in S^{n-1}$  に対して,  $\|Bx\|_2 \leq 1 + 3\varepsilon$

- ▶  $M = \max\{\|Bx\|_2 \mid x \in S^{n-1}\}$  とする
- ▶  $x_0 \in S^{n-1} : M = \|Bx_0\|_2$  を満たすとする
- ▶  $y_0 \in N : \|x_0 - y_0\|_2 \leq \varepsilon$  を満たすとする
- ▶ 計算 :  $M = \|Bx_0\|_2 = \|B(x_0 - y_0 + y_0)\|_2$

## 補題 5.3 の証明 (続 1)

証明すること：任意の  $x \in S^{n-1}$  に対して，  $\|Bx\|_2 \leq 1 + 3\varepsilon$

- ▶  $M = \max\{\|Bx\|_2 \mid x \in S^{n-1}\}$  とする
- ▶  $x_0 \in S^{n-1} : M = \|Bx_0\|_2$  を満たすとする
- ▶  $y_0 \in N : \|x_0 - y_0\|_2 \leq \varepsilon$  を満たすとする
- ▶ 計算：  $M = \|Bx_0\|_2 = \|B(x_0 - y_0 + y_0)\|_2 = \|B(x_0 - y_0) + By_0\|_2$

## 補題 5.3 の証明 (続 1)

証明すること：任意の  $x \in S^{n-1}$  に対して,  $\|Bx\|_2 \leq 1 + 3\varepsilon$

- ▶  $M = \max\{\|Bx\|_2 \mid x \in S^{n-1}\}$  とする
- ▶  $x_0 \in S^{n-1} : M = \|Bx_0\|_2$  を満たすとする
- ▶  $y_0 \in N : \|x_0 - y_0\|_2 \leq \varepsilon$  を満たすとする
- ▶ 計算：
$$M = \|Bx_0\|_2 = \|B(x_0 - y_0 + y_0)\|_2 = \|B(x_0 - y_0) + By_0\|_2$$
$$\leq \|B(x_0 - y_0)\|_2 + \|By_0\|_2 \quad (\text{三角不等式})$$

## 補題 5.3 の証明 (続 1)

証明すること : 任意の  $x \in S^{n-1}$  に対して,  $\|Bx\|_2 \leq 1 + 3\varepsilon$

- ▶  $M = \max\{\|Bx\|_2 \mid x \in S^{n-1}\}$  とする
- ▶  $x_0 \in S^{n-1} : M = \|Bx_0\|_2$  を満たすとする
- ▶  $y_0 \in N : \|x_0 - y_0\|_2 \leq \varepsilon$  を満たすとする
- ▶ 計算 :  $M = \|Bx_0\|_2 = \|B(x_0 - y_0 + y_0)\|_2 = \|B(x_0 - y_0) + By_0\|_2$   
 $\leq \|B(x_0 - y_0)\|_2 + \|By_0\|_2$  (三角不等式)  
 $= \left\| \left( B \frac{x_0 - y_0}{\|x_0 - y_0\|_2} \right) \|x_0 - y_0\|_2 \right\|_2 + \|By_0\|_2$

## 補題 5.3 の証明 (続 1)

証明すること : 任意の  $x \in S^{n-1}$  に対して,  $\|Bx\|_2 \leq 1 + 3\varepsilon$

- ▶  $M = \max\{\|Bx\|_2 \mid x \in S^{n-1}\}$  とする
- ▶  $x_0 \in S^{n-1} : M = \|Bx_0\|_2$  を満たすとする
- ▶  $y_0 \in N : \|x_0 - y_0\|_2 \leq \varepsilon$  を満たすとする
- ▶ 計算 :  $M = \|Bx_0\|_2 = \|B(x_0 - y_0 + y_0)\|_2 = \|B(x_0 - y_0) + By_0\|_2$   
 $\leq \|B(x_0 - y_0)\|_2 + \|By_0\|_2$  (三角不等式)  
 $= \left\| \left( B \frac{x_0 - y_0}{\|x_0 - y_0\|_2} \right) \|x_0 - y_0\|_2 \right\|_2 + \|By_0\|_2$   
 $\leq M \|x_0 - y_0\|_2 + 1 + \varepsilon$

## 補題 5.3 の証明 (続 1)

証明すること : 任意の  $x \in S^{n-1}$  に対して,  $\|Bx\|_2 \leq 1 + 3\varepsilon$

- ▶  $M = \max\{\|Bx\|_2 \mid x \in S^{n-1}\}$  とする
- ▶  $x_0 \in S^{n-1}$  :  $M = \|Bx_0\|_2$  を満たすとする
- ▶  $y_0 \in N$  :  $\|x_0 - y_0\|_2 \leq \varepsilon$  を満たすとする
- ▶ 計算 :  $M = \|Bx_0\|_2 = \|B(x_0 - y_0 + y_0)\|_2 = \|B(x_0 - y_0) + By_0\|_2$   
 $\leq \|B(x_0 - y_0)\|_2 + \|By_0\|_2$  (三角不等式)  
 $= \left\| \left( B \frac{x_0 - y_0}{\|x_0 - y_0\|_2} \right) \|x_0 - y_0\|_2 \right\|_2 + \|By_0\|_2$   
 $\leq M \|x_0 - y_0\|_2 + 1 + \varepsilon$   
 $\leq M\varepsilon + 1 + \varepsilon$

## 補題 5.3 の証明 (続 1)

証明すること : 任意の  $x \in S^{n-1}$  に対して,  $\|Bx\|_2 \leq 1 + 3\varepsilon$

- ▶  $M = \max\{\|Bx\|_2 \mid x \in S^{n-1}\}$  とする
- ▶  $x_0 \in S^{n-1} : M = \|Bx_0\|_2$  を満たすとする
- ▶  $y_0 \in N : \|x_0 - y_0\|_2 \leq \varepsilon$  を満たすとする
- ▶ 計算 :  $M = \|Bx_0\|_2 = \|B(x_0 - y_0 + y_0)\|_2 = \|B(x_0 - y_0) + By_0\|_2$   
 $\leq \|B(x_0 - y_0)\|_2 + \|By_0\|_2$  (三角不等式)  
 $= \left\| \left( B \frac{x_0 - y_0}{\|x_0 - y_0\|_2} \right) \|x_0 - y_0\|_2 \right\|_2 + \|By_0\|_2$   
 $\leq M \|x_0 - y_0\|_2 + 1 + \varepsilon$   
 $\leq M\varepsilon + 1 + \varepsilon$
- ▶  $\therefore M \leq (1 + \varepsilon)/(1 - \varepsilon) \leq 1 + 3\varepsilon$  ( $\because \varepsilon$  は十分小さい)

## 補題 5.3 の証明 (続 1)

証明すること : 任意の  $x \in S^{n-1}$  に対して,  $\|Bx\|_2 \leq 1 + 3\varepsilon$

- ▶  $M = \max\{\|Bx\|_2 \mid x \in S^{n-1}\}$  とする
- ▶  $x_0 \in S^{n-1}$  :  $M = \|Bx_0\|_2$  を満たすとする
- ▶  $y_0 \in N$  :  $\|x_0 - y_0\|_2 \leq \varepsilon$  を満たすとする
- ▶ 計算 :  $M = \|Bx_0\|_2 = \|B(x_0 - y_0 + y_0)\|_2 = \|B(x_0 - y_0) + By_0\|_2$   
 $\leq \|B(x_0 - y_0)\|_2 + \|By_0\|_2$  (三角不等式)  
 $= \left\| \left( B \frac{x_0 - y_0}{\|x_0 - y_0\|_2} \right) \|x_0 - y_0\|_2 \right\|_2 + \|By_0\|_2$   
 $\leq M \|x_0 - y_0\|_2 + 1 + \varepsilon$   
 $\leq M\varepsilon + 1 + \varepsilon$
- ▶  $\therefore M \leq (1 + \varepsilon)/(1 - \varepsilon) \leq 1 + 3\varepsilon$  ( $\because \varepsilon$  は十分小さい)
- ▶  $\therefore \|Bx\|_2 \leq M \leq 1 + 3\varepsilon$

## 補題 5.3 の証明 (続 2)

証明すること：任意の  $x \in S^{n-1}$  に対して,  $\|Bx\|_2 \geq 1 - 3\varepsilon$

▶  $y \in N$  :  $\|x - y\|_2 \leq \varepsilon$  を満たすとする

## 補題 5.3 の証明 (続 2)

証明すること : 任意の  $x \in S^{n-1}$  に対して,  $\|Bx\|_2 \geq 1 - 3\varepsilon$

▶  $y \in N$  :  $\|x - y\|_2 \leq \varepsilon$  を満たすとする

▶ 計算 :  $\|Bx\|_2 \geq \|By\|_2 - \|B(x - y)\|_2$  (三角不等式)

## 補題 5.3 の証明 (続 2)

証明すること：任意の  $x \in S^{n-1}$  に対して,  $\|Bx\|_2 \geq 1 - 3\varepsilon$

▶  $y \in N$  :  $\|x - y\|_2 \leq \varepsilon$  を満たすとする

▶ 計算 :  $\|Bx\|_2 \geq \|By\|_2 - \|B(x - y)\|_2$

(三角不等式)

$$= \|By\|_2 - \left\| B \frac{x - y}{\|x - y\|_2} \|x - y\|_2 \right\|$$

## 補題 5.3 の証明 (続 2)

証明すること：任意の  $x \in S^{n-1}$  に対して,  $\|Bx\|_2 \geq 1 - 3\varepsilon$

▶  $y \in N$  :  $\|x - y\|_2 \leq \varepsilon$  を満たすとする

▶ 計算 :  $\|Bx\|_2 \geq \|By\|_2 - \|B(x - y)\|_2$  (三角不等式)

$$\begin{aligned}
 &= \|By\|_2 - \left\| B \frac{x - y}{\|x - y\|_2} \|x - y\|_2 \right\| \\
 &\geq 1 - \varepsilon - (1 + 3\varepsilon)\varepsilon
 \end{aligned}$$

## 補題 5.3 の証明 (続 2)

証明すること：任意の  $x \in S^{n-1}$  に対して,  $\|Bx\|_2 \geq 1 - 3\varepsilon$

▶  $y \in N$  :  $\|x - y\|_2 \leq \varepsilon$  を満たすとする

▶ 計算 :  $\|Bx\|_2 \geq \|By\|_2 - \|B(x - y)\|_2$  (三角不等式)

$$\begin{aligned}
 &= \|By\|_2 - \left\| B \frac{x - y}{\|x - y\|_2} \|x - y\|_2 \right\| \\
 &\geq 1 - \varepsilon - (1 + 3\varepsilon)\varepsilon \\
 &= 1 - 2\varepsilon - 3\varepsilon^2
 \end{aligned}$$

## 補題 5.3 の証明 (続 2)

証明すること：任意の  $x \in S^{n-1}$  に対して,  $\|Bx\|_2 \geq 1 - 3\varepsilon$

▶  $y \in N$  :  $\|x - y\|_2 \leq \varepsilon$  を満たすとする

▶ 計算 :  $\|Bx\|_2 \geq \|By\|_2 - \|B(x - y)\|_2$  (三角不等式)

$$= \|By\|_2 - \left\| B \frac{x - y}{\|x - y\|_2} \|x - y\|_2 \right\|$$

$$\geq 1 - \varepsilon - (1 + 3\varepsilon)\varepsilon$$

$$= 1 - 2\varepsilon - 3\varepsilon^2$$

$$\geq 1 - 3\varepsilon$$

( $\because \varepsilon$  は十分小さい)

□

## 小さな稠密集合の存在性

## 補題 5.4

任意の  $\varepsilon \in (0, 1]$  に対して,  $\varepsilon$ -稠密集合  $N \subseteq S^{n-1}$  で

$$|N| \leq \left(\frac{4}{\varepsilon}\right)^n$$

を満たすものが存在する

補題の証明で必要となる概念

定義：球

$(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_p)$  において, 中心を  $c \in \mathbb{R}^n$ , 半径を  $r \geq 0$  とする球 (ball) とは,


$$B_p(c, r) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - c\|_p \leq r\}.$$

事実 :  $\text{vol}(B_2(c, r)) = C(n)r^n$

( $C: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  はある関数で,  $C(n) \leq O(1/\sqrt{n})^n$ )


## 補題 5.4 の証明

- ▶ 次の性質を持つ集合  $N \subseteq S^{n-1}$  を考える
  - ▶  $\forall x \in S^{n-1} \setminus N, \exists y \in N: \|x - y\|_2 \leq \varepsilon$
  - ▶  $\forall y, y' \in N: \|y - y'\|_2 > \varepsilon$




## 補題 5.4 の証明

- ▶ 次の性質を持つ集合  $N \subseteq S^{n-1}$  を考える
  - ▶  $\forall x \in S^{n-1} \setminus N, \exists y \in N: \|x - y\|_2 \leq \varepsilon$
  - ▶  $\forall y, y' \in N: \|y - y'\|_2 > \varepsilon$
- ▶  $N$  は  $\varepsilon$ -稠密集合であり、そのような  $N$  は存在する




## 補題 5.4 の証明

- ▶ 次の性質を持つ集合  $N \subseteq S^{n-1}$  を考える
  - ▶  $\forall x \in S^{n-1} \setminus N, \exists y \in N: \|x - y\|_2 \leq \varepsilon$
  - ▶  $\forall y, y' \in N: \|y - y'\|_2 > \varepsilon$
- ▶  $N$  は  $\varepsilon$ -稠密集合であり、そのような  $N$  は存在する
- ▶  $\forall y, y' \in N: B_2(y, \varepsilon/2) \cap B_2(y', \varepsilon/2) = \emptyset$




## 補題 5.4 の証明

- ▶ 次の性質を持つ集合  $N \subseteq S^{n-1}$  を考える
  - ▶  $\forall x \in S^{n-1} \setminus N, \exists y \in N: \|x - y\|_2 \leq \varepsilon$
  - ▶  $\forall y, y' \in N: \|y - y'\|_2 > \varepsilon$
- ▶  $N$  は  $\varepsilon$ -稠密集合であり、そのような  $N$  は存在する
- ▶  $\forall y, y' \in N: B_2(y, \varepsilon/2) \cap B_2(y', \varepsilon/2) = \emptyset$
- ▶  $\forall y \in N: B_2(y, \varepsilon/2) \subseteq B_2(0, 1 + \varepsilon/2) \subseteq B_2(0, 2)$




## 補題 5.4 の証明

- ▶ 次の性質を持つ集合  $N \subseteq S^{n-1}$  を考える
  - ▶  $\forall x \in S^{n-1} \setminus N, \exists y \in N: \|x - y\|_2 \leq \varepsilon$
  - ▶  $\forall y, y' \in N: \|y - y'\|_2 > \varepsilon$
- ▶  $N$  は  $\varepsilon$ -稠密集合であり、そのような  $N$  は存在する
- ▶  $\forall y, y' \in N: B_2(y, \varepsilon/2) \cap B_2(y', \varepsilon/2) = \emptyset$
- ▶  $\forall y \in N: B_2(y, \varepsilon/2) \subseteq B_2(0, 1 + \varepsilon/2) \subseteq B_2(0, 2)$
- ▶  $\therefore |N| \text{vol}(B_2(0, \varepsilon/2)) \leq \text{vol}(B_2(0, 2))$




## 補題 5.4 の証明

- ▶ 次の性質を持つ集合  $N \subseteq S^{n-1}$  を考える
  - ▶  $\forall x \in S^{n-1} \setminus N, \exists y \in N: \|x - y\|_2 \leq \varepsilon$
  - ▶  $\forall y, y' \in N: \|y - y'\|_2 > \varepsilon$
- ▶  $N$  は  $\varepsilon$ -稠密集合であり、そのような  $N$  は存在する
- ▶  $\forall y, y' \in N: B_2(y, \varepsilon/2) \cap B_2(y', \varepsilon/2) = \emptyset$
- ▶  $\forall y \in N: B_2(y, \varepsilon/2) \subseteq B_2(0, 1 + \varepsilon/2) \subseteq B_2(0, 2)$
- ▶  $\therefore |N| \text{vol}(B_2(0, \varepsilon/2)) \leq \text{vol}(B_2(0, 2))$
- ▶  $\therefore |N| C(n) (\varepsilon/2)^n \leq C(n) 2^n$



## 補題 5.4 の証明

- ▶ 次の性質を持つ集合  $N \subseteq S^{n-1}$  を考える
  - ▶  $\forall x \in S^{n-1} \setminus N, \exists y \in N: \|x - y\|_2 \leq \varepsilon$
  - ▶  $\forall y, y' \in N: \|y - y'\|_2 > \varepsilon$
- ▶  $N$  は  $\varepsilon$ -稠密集合であり、そのような  $N$  は存在する
- ▶  $\forall y, y' \in N: B_2(y, \varepsilon/2) \cap B_2(y', \varepsilon/2) = \emptyset$
- ▶  $\forall y \in N: B_2(y, \varepsilon/2) \subseteq B_2(0, 1 + \varepsilon/2) \subseteq B_2(0, 2)$
- ▶  $\therefore |N| \text{vol}(B_2(0, \varepsilon/2)) \leq \text{vol}(B_2(0, 2))$
- ▶  $\therefore |N| C(n) (\varepsilon/2)^n \leq C(n) 2^n$
- ▶  $\therefore |N| \leq (4/\varepsilon)^n$



□

## 定理 5.2 の証明の流れ (再掲)

## 証明の方針

- ▶ 「任意の  $x$  に対して」が確率の外にあるので、中に入れたい
- ▶ 「任意の  $x$ 」を「ある有限集合  $N$  の任意の要素  $x$ 」に変えたい
- ▶ これにより、合併上界 (union bound) が適用できるようになる

## 証明の流れ

- ① 有限稠密集合  $N$  を定義
- ② 空間全体  $\mathbb{R}^n$  と有限稠密集合  $N$  の関係を考察
- ③ 全体は、矛盾を導いて証明

## 定理 5.2 の証明 (1)

▶  $t = 3r$  とする ( $t \leq n$  と仮定してよい ( $C$  を十分大きな定数として))

$$\Pr \left[ \begin{array}{l} |\text{supp}(x)| \leq t \text{ を満たすある } x \in \mathbb{R}^n \text{ に対して} \\ (1 - \varepsilon)\|x\|_2 \leq \|Bx\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|x\|_2 \text{ が不成立} \end{array} \right]$$

## 定理 5.2 の証明 (1)

▶  $t = 3r$  とする ( $t \leq n$  と仮定してよい ( $C$  を十分大きな定数として))

$$\begin{aligned} & \Pr \left[ \begin{array}{l} |\text{supp}(x)| \leq t \text{ を満たすある } x \in \mathbb{R}^n \text{ に対して} \\ (1 - \varepsilon)\|x\|_2 \leq \|Bx\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|x\|_2 \text{ が不成立} \end{array} \right] \\ & \leq \sum_{\substack{T \subseteq \{1, \dots, n\}, \\ |T| \leq t}} \Pr \left[ \begin{array}{l} \text{supp}(x) \subseteq T \text{ を満たすある } x \in \mathbb{R}^n \text{ に対して} \\ (1 - \varepsilon)\|x\|_2 \leq \|Bx\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|x\|_2 \text{ が不成立} \end{array} \right] \end{aligned}$$

## 定理 5.2 の証明 (1)

▶  $t = 3r$  とする ( $t \leq n$  と仮定してよい ( $C$  を十分大きな定数として))

$$\begin{aligned}
 & \Pr \left[ \begin{array}{l} |\text{supp}(x)| \leq t \text{ を満たすある } x \in \mathbb{R}^n \text{ に対して} \\ (1 - \varepsilon)\|x\|_2 \leq \|Bx\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|x\|_2 \text{ が不成立} \end{array} \right] \\
 & \leq \sum_{\substack{T \subseteq \{1, \dots, n\}, \\ |T| \leq t}} \Pr \left[ \begin{array}{l} \text{supp}(x) \subseteq T \text{ を満たすある } x \in \mathbb{R}^n \text{ に対して} \\ (1 - \varepsilon)\|x\|_2 \leq \|Bx\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|x\|_2 \text{ が不成立} \end{array} \right] \\
 & = \sum_{\substack{T \subseteq \{1, \dots, n\}, \\ |T| \leq t}} \Pr \left[ \begin{array}{l} \text{ある } \tilde{x} \in \mathbb{R}^{|T|} \text{ に対して} \\ (1 - \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \leq \|B_T \tilde{x}\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \text{ が不成立} \end{array} \right]
 \end{aligned}$$

## 記法

$B_T \in \mathbb{R}^{m \times |T|}$  :  $T$  に対応する  $B$  の列からなる行列

## 定理 5.2 の証明 (2)

$T \subseteq \{1, \dots, n\}$ ,  $|T| \leq t$ : 固定

▶  $N_T \subseteq S^{|T|-1}$ :  $\varepsilon$ -稠密集合 (ただし,  $|N_T| \leq (4/\varepsilon)^{|T|}$ )

## 補題 5.3 の帰結

$\exists \tilde{x} \in \mathbb{R}^{|T|}$ :  $(1 - \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \leq \|B_T \tilde{x}\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2$  が不成立  $\Rightarrow$   
 $\exists y \in N_T$ :  $(1 - \varepsilon/3)\|y\|_2 \leq \|B_T y\|_2 \leq (1 + \varepsilon/3)\|y\|_2$  が不成立

## 定理 5.2 の証明 (2)

$T \subseteq \{1, \dots, n\}$ ,  $|T| \leq t$ : 固定

▶  $N_T \subseteq S^{|T|-1}$ :  $\varepsilon$ -稠密集合 (ただし,  $|N_T| \leq (4/\varepsilon)^{|T|}$ )

## 補題 5.3 の帰結

$\exists \tilde{x} \in \mathbb{R}^{|T|}$ :  $(1 - \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \leq \|B_T \tilde{x}\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2$  が不成立  $\Rightarrow$   
 $\exists y \in N_T$ :  $(1 - \varepsilon/3)\|y\|_2 \leq \|B_T y\|_2 \leq (1 + \varepsilon/3)\|y\|_2$  が不成立

$\Pr \left[ \begin{array}{l} \text{ある } \tilde{x} \in \mathbb{R}^{|T|} \text{ に対して} \\ (1 - \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \leq \|B_T \tilde{x}\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \text{ が不成立} \end{array} \right]$

## 定理 5.2 の証明 (2)

$T \subseteq \{1, \dots, n\}$ ,  $|T| \leq t$ : 固定

▶  $N_T \subseteq S^{|T|-1}$ :  $\varepsilon$ -稠密集合 (ただし,  $|N_T| \leq (4/\varepsilon)^{|T|}$ )

## 補題 5.3 の帰結

$\exists \tilde{x} \in \mathbb{R}^{|T|}$ :  $(1 - \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \leq \|B_T \tilde{x}\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2$  が不成立  $\Rightarrow$   
 $\exists y \in N_T$ :  $(1 - \varepsilon/3)\|y\|_2 \leq \|B_T y\|_2 \leq (1 + \varepsilon/3)\|y\|_2$  が不成立

$$\Pr \left[ \begin{array}{l} \text{ある } \tilde{x} \in \mathbb{R}^{|T|} \text{ に対して} \\ (1 - \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \leq \|B_T \tilde{x}\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \text{ が不成立} \end{array} \right] \\ \leq \Pr \left[ \begin{array}{l} \text{ある } y \in N_T \text{ に対して} \\ (1 - \varepsilon/3)\|y\|_2 \leq \|B_T y\|_2 \leq (1 + \varepsilon/3)\|y\|_2 \text{ が不成立} \end{array} \right]$$

## 定理 5.2 の証明 (2)

$T \subseteq \{1, \dots, n\}$ ,  $|T| \leq t$ : 固定

▶  $N_T \subseteq S^{|T|-1}$ :  $\varepsilon$ -稠密集合 (ただし,  $|N_T| \leq (4/\varepsilon)^{|T|}$ )

## 補題 5.3 の帰結

$\exists \tilde{x} \in \mathbb{R}^{|T|}$ :  $(1 - \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \leq \|B_T \tilde{x}\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2$  が不成立  $\Rightarrow$   
 $\exists y \in N_T$ :  $(1 - \varepsilon/3)\|y\|_2 \leq \|B_T y\|_2 \leq (1 + \varepsilon/3)\|y\|_2$  が不成立

$$\begin{aligned} & \Pr \left[ \begin{array}{l} \text{ある } \tilde{x} \in \mathbb{R}^{|T|} \text{ に対して} \\ (1 - \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \leq \|B_T \tilde{x}\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \text{ が不成立} \end{array} \right] \\ & \leq \Pr \left[ \begin{array}{l} \text{ある } y \in N_T \text{ に対して} \\ (1 - \varepsilon/3)\|y\|_2 \leq \|B_T y\|_2 \leq (1 + \varepsilon/3)\|y\|_2 \text{ が不成立} \end{array} \right] \\ & \leq \sum_{y \in N_T} \Pr [(1 - \varepsilon/3)\|y\|_2 \leq \|B_T y\|_2 \leq (1 + \varepsilon/3)\|y\|_2 \text{ が不成立}] \end{aligned}$$

## 定理 5.2 の証明 (2)

$T \subseteq \{1, \dots, n\}$ ,  $|T| \leq t$ : 固定

▶  $N_T \subseteq S^{|T|-1}$ :  $\varepsilon$ -稠密集合 (ただし,  $|N_T| \leq (4/\varepsilon)^{|T|}$ )

## 補題 5.3 の帰結

$\exists \tilde{x} \in \mathbb{R}^{|T|}$ :  $(1 - \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \leq \|B_T \tilde{x}\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2$  が不成立  $\Rightarrow$   
 $\exists y \in N_T$ :  $(1 - \varepsilon/3)\|y\|_2 \leq \|B_T y\|_2 \leq (1 + \varepsilon/3)\|y\|_2$  が不成立

$$\begin{aligned} & \Pr \left[ \begin{array}{l} \text{ある } \tilde{x} \in \mathbb{R}^{|T|} \text{ に対して} \\ (1 - \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \leq \|B_T \tilde{x}\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \text{ が不成立} \end{array} \right] \\ & \leq \Pr \left[ \begin{array}{l} \text{ある } y \in N_T \text{ に対して} \\ (1 - \varepsilon/3)\|y\|_2 \leq \|B_T y\|_2 \leq (1 + \varepsilon/3)\|y\|_2 \text{ が不成立} \end{array} \right] \\ & \leq \sum_{y \in N_T} \Pr [(1 - \varepsilon/3)\|y\|_2 \leq \|B_T y\|_2 \leq (1 + \varepsilon/3)\|y\|_2 \text{ が不成立}] \\ & \leq \sum_{y \in N_T} \exp(-c_0 m) \qquad \qquad \qquad (\text{補題 4.1 の帰結}) \end{aligned}$$

## 定理 5.2 の証明 (2)

$T \subseteq \{1, \dots, n\}$ ,  $|T| \leq t$ : 固定

▶  $N_T \subseteq S^{|T|-1}$ :  $\varepsilon$ -稠密集合 (ただし,  $|N_T| \leq (4/\varepsilon)^{|T|}$ )

## 補題 5.3 の帰結

$\exists \tilde{x} \in \mathbb{R}^{|T|}$ :  $(1 - \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \leq \|B_T \tilde{x}\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2$  が不成立  $\Rightarrow$   
 $\exists y \in N_T$ :  $(1 - \varepsilon/3)\|y\|_2 \leq \|B_T y\|_2 \leq (1 + \varepsilon/3)\|y\|_2$  が不成立

$$\begin{aligned} & \Pr \left[ \begin{array}{l} \text{ある } \tilde{x} \in \mathbb{R}^{|T|} \text{ に対して} \\ (1 - \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \leq \|B_T \tilde{x}\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \text{ が不成立} \end{array} \right] \\ & \leq \Pr \left[ \begin{array}{l} \text{ある } y \in N_T \text{ に対して} \\ (1 - \varepsilon/3)\|y\|_2 \leq \|B_T y\|_2 \leq (1 + \varepsilon/3)\|y\|_2 \text{ が不成立} \end{array} \right] \\ & \leq \sum_{y \in N_T} \Pr [(1 - \varepsilon/3)\|y\|_2 \leq \|B_T y\|_2 \leq (1 + \varepsilon/3)\|y\|_2 \text{ が不成立}] \\ & \leq \sum_{y \in N_T} \exp(-c_0 m) \qquad \qquad \qquad (\text{補題 4.1 の帰結}) \\ & \leq (4/\varepsilon)^{|T|} \exp(-c_0 m) \end{aligned}$$

## 定理 5.2 の証明 (2)

$T \subseteq \{1, \dots, n\}$ ,  $|T| \leq t$ : 固定

▶  $N_T \subseteq S^{|T|-1}$ :  $\varepsilon$ -稠密集合 (ただし,  $|N_T| \leq (4/\varepsilon)^{|T|}$ )

## 補題 5.3 の帰結

$\exists \tilde{x} \in \mathbb{R}^{|T|}$ :  $(1 - \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \leq \|B_T \tilde{x}\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2$  が不成立  $\Rightarrow$   
 $\exists y \in N_T$ :  $(1 - \varepsilon/3)\|y\|_2 \leq \|B_T y\|_2 \leq (1 + \varepsilon/3)\|y\|_2$  が不成立

$$\begin{aligned} & \Pr \left[ \begin{array}{l} \text{ある } \tilde{x} \in \mathbb{R}^{|T|} \text{ に対して} \\ (1 - \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \leq \|B_T \tilde{x}\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \text{ が不成立} \end{array} \right] \\ & \leq \Pr \left[ \begin{array}{l} \text{ある } y \in N_T \text{ に対して} \\ (1 - \varepsilon/3)\|y\|_2 \leq \|B_T y\|_2 \leq (1 + \varepsilon/3)\|y\|_2 \text{ が不成立} \end{array} \right] \\ & \leq \sum_{y \in N_T} \Pr [(1 - \varepsilon/3)\|y\|_2 \leq \|B_T y\|_2 \leq (1 + \varepsilon/3)\|y\|_2 \text{ が不成立}] \\ & \leq \sum_{y \in N_T} \exp(-c_0 m) \qquad \qquad \qquad (\text{補題 4.1 の帰結}) \\ & \leq (4/\varepsilon)^{|T|} \exp(-c_0 m) \leq (4/\varepsilon)^t \exp(-c_0 m) \end{aligned}$$

## 定理 5.2 の証明 (3)

$$\begin{aligned}
& \Pr \left[ \begin{array}{l} |\text{supp}(x)| \leq t \text{ を満たすある } x \in \mathbb{R}^n \text{ に対して} \\ (1 - \varepsilon)\|x\|_2 \leq \|Bx\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|x\|_2 \text{ が不成立} \end{array} \right] \\
& \leq \sum_{\substack{T \subseteq \{1, \dots, n\}, \\ |T| \leq t}} \Pr \left[ \begin{array}{l} \text{ある } \tilde{x} \in \mathbb{R}^{|T|} \text{ に対して} \\ (1 - \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \leq \|B_T \tilde{x}\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \text{ が不成立} \end{array} \right] \\
& \leq \sum_{\substack{T \subseteq \{1, \dots, n\}, \\ |T| \leq t}} (4/\varepsilon)^t \exp(-c_0 m)
\end{aligned}$$

## 定理 5.2 の証明 (3)

$$\begin{aligned}
& \Pr \left[ |\text{supp}(x)| \leq t \text{ を満たすある } x \in \mathbb{R}^n \text{ に対して} \right. \\
& \quad \left. (1 - \varepsilon)\|x\|_2 \leq \|Bx\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|x\|_2 \text{ が不成立} \right] \\
& \leq \sum_{\substack{T \subseteq \{1, \dots, n\}, \\ |T| \leq t}} \Pr \left[ \text{ある } \tilde{x} \in \mathbb{R}^{|T|} \text{ に対して} \right. \\
& \quad \left. (1 - \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \leq \|B_T \tilde{x}\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \text{ が不成立} \right] \\
& \leq \sum_{\substack{T \subseteq \{1, \dots, n\}, \\ |T| \leq t}} (4/\varepsilon)^t \exp(-c_0 m) \\
& = \left( \sum_{i=1}^t \binom{n}{i} \right) (4/\varepsilon)^t \exp(-c_0 m)
\end{aligned}$$

## 定理 5.2 の証明 (3)

$$\begin{aligned}
 & \Pr \left[ \begin{array}{l} |\text{supp}(x)| \leq t \text{ を満たすある } x \in \mathbb{R}^n \text{ に対して} \\ (1 - \varepsilon)\|x\|_2 \leq \|Bx\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|x\|_2 \text{ が不成立} \end{array} \right] \\
 & \leq \sum_{\substack{T \subseteq \{1, \dots, n\}, \\ |T| \leq t}} \Pr \left[ \begin{array}{l} \text{ある } \tilde{x} \in \mathbb{R}^{|T|} \text{ に対して} \\ (1 - \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \leq \|B_T \tilde{x}\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \text{ が不成立} \end{array} \right] \\
 & \leq \sum_{\substack{T \subseteq \{1, \dots, n\}, \\ |T| \leq t}} (4/\varepsilon)^t \exp(-c_0 m) \\
 & = \left( \sum_{i=1}^t \binom{n}{i} \right) (4/\varepsilon)^t \exp(-c_0 m) \\
 & \leq (en/t)^t (4/\varepsilon)^t \exp(-c_0 m)
 \end{aligned}$$

### 事実 (演習問題)

任意の  $k \leq n$  に対して,  $\sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \leq (en/k)^k$

## 定理 5.2 の証明 (3)

$$\begin{aligned}
& \Pr \left[ \begin{array}{l} |\text{supp}(x)| \leq t \text{ を満たすある } x \in \mathbb{R}^n \text{ に対して} \\ (1 - \varepsilon)\|x\|_2 \leq \|Bx\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|x\|_2 \text{ が不成立} \end{array} \right] \\
& \leq \sum_{\substack{T \subseteq \{1, \dots, n\}, \\ |T| \leq t}} \Pr \left[ \begin{array}{l} \text{ある } \tilde{x} \in \mathbb{R}^{|T|} \text{ に対して} \\ (1 - \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \leq \|B_T \tilde{x}\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|\tilde{x}\|_2 \text{ が不成立} \end{array} \right] \\
& \leq \sum_{\substack{T \subseteq \{1, \dots, n\}, \\ |T| \leq t}} (4/\varepsilon)^t \exp(-c_0 m) \\
& = \left( \sum_{i=1}^t \binom{n}{i} \right) (4/\varepsilon)^t \exp(-c_0 m) \\
& \leq (en/t)^t (4/\varepsilon)^t \exp(-c_0 m) = \exp(t \ln(en/t) + t \ln(4/\varepsilon) - c_0 m)
\end{aligned}$$

## 事実 (演習問題)

任意の  $k \leq n$  に対して,  $\sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \leq (en/k)^k$

## 定理 5.2 の証明 (4)

$$\exp(t \ln(en/t) + t \ln(4/\varepsilon) - c_0 m)$$

## 定理 5.2 の証明 (4)

$$\begin{aligned} & \exp(t \ln(en/t) + t \ln(4/\varepsilon) - c_0 m) \\ &= \exp(3r \ln(en/3r) + 3r \ln(4/\varepsilon) - c_0 m) \end{aligned} \quad (\because t = 3r)$$

## 定理 5.2 の証明 (4)

$$\begin{aligned} & \exp(t \ln(en/t) + t \ln(4/\varepsilon) - c_0 m) \\ &= \exp(3r \ln(en/3r) + 3r \ln(4/\varepsilon) - c_0 m) && (\because t = 3r) \\ &= \exp\left(3r \ln\left(\frac{4en}{3\varepsilon r}\right) - c_0 m\right) \end{aligned}$$

## 定理 5.2 の証明 (4)

$$\begin{aligned}
& \exp(t \ln(en/t) + t \ln(4/\varepsilon) - c_0 m) \\
&= \exp(3r \ln(en/3r) + 3r \ln(4/\varepsilon) - c_0 m) && (\because t = 3r) \\
&= \exp\left(3r \ln\left(\frac{4e n}{3\varepsilon r}\right) - c_0 m\right) \\
&< \exp\left(3r \ln\left(\frac{n}{r}\right)^{c'} - c_0 m\right) && (c' > 0 \text{ はある定数})
\end{aligned}$$

## 定理 5.2 の証明 (4)

$$\begin{aligned}
& \exp(t \ln(en/t) + t \ln(4/\varepsilon) - c_0 m) \\
&= \exp(3r \ln(en/3r) + 3r \ln(4/\varepsilon) - c_0 m) && (\because t = 3r) \\
&= \exp\left(3r \ln\left(\frac{4e n}{3\varepsilon r}\right) - c_0 m\right) \\
&< \exp\left(3r \ln\left(\frac{n}{r}\right)^{c'} - c_0 m\right) && (c' > 0 \text{ はある定数}) \\
&= \exp(3c' r \ln(n/r) - c_0 m)
\end{aligned}$$

## 定理 5.2 の証明 (4)

$$\begin{aligned}
& \exp(t \ln(en/t) + t \ln(4/\varepsilon) - c_0 m) \\
&= \exp(3r \ln(en/3r) + 3r \ln(4/\varepsilon) - c_0 m) && (\because t = 3r) \\
&= \exp\left(3r \ln\left(\frac{4e n}{3\varepsilon r}\right) - c_0 m\right) \\
&< \exp\left(3r \ln\left(\frac{n}{r}\right)^{c'} - c_0 m\right) && (c' > 0 \text{ はある定数}) \\
&= \exp(3c' r \ln(n/r) - c_0 m) \\
&\leq \exp(3c' \frac{1}{C} m - c_0 m) && (\because m \geq Cr \ln(n/r))
\end{aligned}$$

## 定理 5.2 の証明 (4)

$$\begin{aligned}
& \exp(t \ln(en/t) + t \ln(4/\varepsilon) - c_0 m) \\
&= \exp(3r \ln(en/3r) + 3r \ln(4/\varepsilon) - c_0 m) && (\because t = 3r) \\
&= \exp\left(3r \ln\left(\frac{4e n}{3\varepsilon r}\right) - c_0 m\right) \\
&< \exp\left(3r \ln\left(\frac{n}{r}\right)^{c'} - c_0 m\right) && (c' > 0 \text{ はある定数}) \\
&= \exp(3c' r \ln(n/r) - c_0 m) \\
&\leq \exp\left(3c' \frac{1}{C} m - c_0 m\right) && (\because m \geq Cr \ln(n/r)) \\
&= \exp\left(\left(\frac{3c'}{C} - c_0\right) m\right)
\end{aligned}$$

## 定理 5.2 の証明 (4)

$$\begin{aligned}
& \exp(t \ln(en/t) + t \ln(4/\varepsilon) - c_0 m) \\
&= \exp(3r \ln(en/3r) + 3r \ln(4/\varepsilon) - c_0 m) && (\because t = 3r) \\
&= \exp\left(3r \ln\left(\frac{4e n}{3\varepsilon r}\right) - c_0 m\right) \\
&< \exp\left(3r \ln\left(\frac{n}{r}\right)^{c'} - c_0 m\right) && (c' > 0 \text{ はある定数}) \\
&= \exp(3c' r \ln(n/r) - c_0 m) \\
&\leq \exp\left(3c' \frac{1}{C} m - c_0 m\right) && (\because m \geq Cr \ln(n/r)) \\
&= \exp\left(\left(\frac{3c'}{C} - c_0\right) m\right) \\
&= \exp(-cm) && (c > 0 \text{ はある定数})
\end{aligned}$$

## 定理 5.2 の証明 (5)

## ここまでのまとめ

$$\Pr \left[ \begin{array}{l} |\text{supp}(x)| \leq 3r \text{ を満たすある } x \in \mathbb{R}^n \text{ に対して} \\ (1 - \varepsilon)\|x\|_2 \leq \|Bx\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|x\|_2 \text{ が不成立} \end{array} \right] < \exp(-cm)$$

## 定理 5.2 の証明 (5)

## ここまでのまとめ

$$\Pr \left[ \begin{array}{l} |\text{supp}(x)| \leq 3r \text{ を満たすある } x \in \mathbb{R}^n \text{ に対して} \\ (1 - \varepsilon)\|x\|_2 \leq \|Bx\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|x\|_2 \text{ が不成立} \end{array} \right] < \exp(-cm)$$

したがって,

$$\Pr \left[ \begin{array}{l} |\text{supp}(x)| \leq 3r \text{ を満たす任意の } x \in \mathbb{R}^n \text{ に対して} \\ (1 - \varepsilon)\|x\|_2 \leq \|Bx\|_2 \leq (1 + \varepsilon)\|x\|_2 \end{array} \right] \geq 1 - \exp(-cm)$$

□

- ① 線形方程式系の疎解
- ② 基底追跡
- ③ 基底追跡の理論的解析：制限付等長性
- ④ 基底追跡：補足


## まとめ

- ▶ 線形方程式系の疎解探索
  - ▶ 多くの応用
  - ▶ NP 困難
- ▶ 基底追跡
  - ▶ 疎解探索に対するヒューリスティック解法
  - ▶ 線形計画問題
  - ▶ 係数行列が JL 補題のもの  $\Rightarrow$  基底追跡の最適解が疎解

## 計算機実験

- ▶  $n = 2000, r = 20$  : 固定
- ▶  $m = 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280$  : 変化
- ▶  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  : 各成分が独立に  $\mathcal{N}(0, 1)$  に従う
- ▶  $B = \frac{1}{\sqrt{m}}A$
- ▶ 疎解  $y \in \mathbb{R}^n$ 
  - ▶ 重複を許し,  $r$  個の添字を一様ランダムに選択
  - ▶ 選んだ添字に対応する成分を  $U(-10, 10)$  に従って選択
- ▶  $b = By$
- ▶ BP :  $\inf\{\|x\|_1 \mid Bx = b\}$

## 計算機実験：プロット



## $m$ のとり得る値について

- ▶ 定理 5.2 では

$$m = \Omega(r \ln(n/r))$$

という下界があった ( $m$  が小さすぎてはいけない)

- ▶ これは次の意味でタイト

### 事実 (Donoho '06)

$m = o(r \ln(n/r))$  であるとき、定理 5.2 のように作成した  $B$  に対して基底追跡の唯一解は元の線形方程式系の疎解にならない

「中心対称近傍多面体 (centrally symmetric neighborly polytope)」に関する Linial, Novik ('06) の結果に基づく (Pfeifle '06 も参照)

⇨ 閾値現象の存在を示している

## 注意

- ▶ 「基底追跡」は疎解探索問題の緩和問題と見なすことができるが、昨日の講義で導入した意味で緩和問題になるわけではない
- ▶ 「疎解探索問題は組合せ的な問題なので NP 困難である」という言い方がよくされるが、正しくない  
(組合せ的な問題でも簡単なものはある)

## 線形行列方程式の低階数解探索

## 線形行列方程式の低階数解探索

## 入力

- ▶ 線形関数  $\mathcal{A}: \mathbb{R}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{R}^p$ , ベクトル  $b \in \mathbb{R}^p$ , 自然数  $r$

## 出力

- ▶ 方程式  $\mathcal{A}(X) = b$  の解  $X \in \mathbb{R}^{m \times n}$  で  $\text{rank}(X) \leq r$  を満たすもの

- ▶ 「線形方程式系の疎解探索」を特殊な場合として含む
- ▶ 多くの応用
- ▶ SDP を用いたヒューリスティック解法 (nuclear norm minimization)
  - ▶ RIP に類似した条件を  $\mathcal{A}$  が満たす
    - ⇒ SDP ヒューリスティクスが低階数解を出力する
  - ▶ ランダムな線形関数  $\mathcal{A}$  は RIP を満たす

(Recht, Fazel, Parrilo '10)

Parrilo の発表 ('09) はよい情報源

<http://www.mit.edu/~parrilo/pubs/talkfiles/ISMP2009.pdf>

- ① 線形方程式系の疎解
- ② 基底追跡
- ③ 基底追跡の理論的解析：制限付等長性
- ④ 基底追跡：補足

## 文献情報

今回の講義の内容は次の文献に基づく

- ▶ J. Matoušek. Basis pursuit and the Johnson–Lindenstrauss lemma (Lecture Notes). 2007.

それは次の論文に基づく

- ▶ R. Baraniuk, M. Davenport, R. DeVore, M. Wakin. A simple proof of the restricted isometry property for random matrices. *Constructive Approximation* 28 (2008) 253–263.

圧縮センシングに関する web 情報源 (膨大な関連文献情報)

- ▶ <http://dsp.rice.edu/cs>