

離散数学 第 9 回  
順序と同値関係 (1) : 関係

岡本 吉央  
okamotoy@uec.ac.jp

電気通信大学

2012 年 6 月 19 日

最終更新 : 2012 年 6 月 18 日 03:55

## 今日の目標

- ▶ 関係を理解する
- ▶ 関係の性質を理解する
  - ▶ 反射性, 完全性, 対称性, 反対称性, 推移性
- ▶ 特殊な関係を理解する
  - ▶ 順序 (半順序), 全順序, 同値関係

# 目次

- ① 共通点は何？
- ② 関係
- ③ 関係の性質
- ④ 順序と同値関係
- ⑤ 今日のまとめ

## 6の約数は？

## 問題 1

6の約数を全部挙げよ

解答：1, 2, 3, 6

$\{a, b\}$  の部分集合は？

## 問題 2


集合  $\{a, b\}$  の部分集合を全部挙げよ

解答： $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}$





スタートからゴールまで最短で行く方法は？

### 問題 3

次の図の P から Q まで最短でいく方法を全部挙げよ



解答：




## 6の約数は？ 再登場

## 問題 1

6の約数を全部挙げよ

解答：1, 2, 3, 6

「 $m$ は $n$ の約数」のとき， $m$ から $n$ に矢印を引いて絵を描く


$\{a, b\}$  の部分集合は？

## 問題 2

集合  $\{a, b\}$  の部分集合を全部挙げよ

解答： $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}$


「 $A$  は  $B$  の部分集合」のとき， $A$  から  $B$  に矢印を引いて絵を描く




スタートからゴールまで最短で行く方法は？

### 問題 3

次の図の P から Q まで最短でいく方法を全部挙げよ




「経路 1 が経路 2 の上にいかない」とき，経路 1 から 2 に矢印を...



## 共通点？ なぜ？

この3つは「同じ形」をしている

- ▶ 「同じ形」とは何？
- ▶ なぜ同じ形をしている？



## 格言

抽象化，それが数学の威力の1つ

# 目次

- ① 共通点は何？
- ② 関係
- ③ 関係の性質
- ④ 順序と同値関係
- ⑤ 今日のまとめ

## 関係とは？

集合  $A$ 

## 関係とは？ (常識に基づく定義)

 $A$  上の**関係**は次のように定められるもの

- ▶ 関係を表す記号「 $R$ 」がある (例えば,  $\leq$  や  $=$  や  $\subseteq$ )
- ▶ 任意の  $x, y \in A$  に対して  
「 $xRy$ 」が成り立つか成り立たないか, のどちらか

注:  $xRy$  が成り立っても,  $yRx$  が成り立つとは限らない

## 例 1

## 例 1

- ▶  $A = \{1, 2, 3, 6\}$
- ▶ 任意の  $x, y \in A$  に対して

$x \mid y$  であることを  $x$  は  $y$  の約数である

と定義する

- |              |              |   |              |   |              |   |
|--------------|--------------|---|--------------|---|--------------|---|
| ▶ $1 \mid 1$ | ▶ $2 \mid 1$ | × | ▶ $3 \mid 1$ | × | ▶ $6 \mid 1$ | × |
| ▶ $1 \mid 2$ | ▶ $2 \mid 2$ |   | ▶ $3 \mid 2$ | × | ▶ $6 \mid 2$ | × |
| ▶ $1 \mid 3$ | ▶ $2 \mid 3$ | × | ▶ $3 \mid 3$ |   | ▶ $6 \mid 3$ | × |
| ▶ $1 \mid 6$ | ▶ $2 \mid 6$ |   | ▶ $3 \mid 6$ |   | ▶ $6 \mid 6$ |   |

## 関係の表現法 (1) : 関数

## 関数としての関係の表現

$A$  上の関係  $R$  を関数  $A^2 \rightarrow \{ \quad, \times \}$ ,

$$(x, y) \mapsto \begin{cases} \quad & (x R y \text{ のとき}) \\ \times & (x R y \text{ ではないとき}) \end{cases}$$

で表現する

例 1 の場合

- |                            |                             |                             |                             |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ▶ (1, 1) $\mapsto$ $\quad$ | ▶ (2, 1) $\mapsto$ $\times$ | ▶ (3, 1) $\mapsto$ $\times$ | ▶ (6, 1) $\mapsto$ $\times$ |
| ▶ (1, 2) $\mapsto$ $\quad$ | ▶ (2, 2) $\mapsto$ $\quad$  | ▶ (3, 2) $\mapsto$ $\times$ | ▶ (6, 2) $\mapsto$ $\times$ |
| ▶ (1, 3) $\mapsto$ $\quad$ | ▶ (2, 3) $\mapsto$ $\times$ | ▶ (3, 3) $\mapsto$ $\quad$  | ▶ (6, 3) $\mapsto$ $\times$ |
| ▶ (1, 6) $\mapsto$ $\quad$ | ▶ (2, 6) $\mapsto$ $\quad$  | ▶ (3, 6) $\mapsto$ $\quad$  | ▶ (6, 6) $\mapsto$ $\quad$  |

## 関係の表現法 (2) : 集合

## 集合としての関係の表現

A 上の関係  $R$  を集合

$$\{(x, y) \mid x \in A \text{ かつ } y \in A \text{ かつ } x R y\}$$

で表現する

例 1 の場合

$$\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 6), (2, 2), (2, 6), (3, 3), (3, 6), (6, 6)\}$$

## 関係の表現法 (3) : グラフ


## 集合としての関係の表現

A 上の関係  $R$  を

- ▶ 頂点集合を  $A$  として,
- ▶  $xRy$  であるとき, そのときに限り  $x \rightarrow y$  という矢印を引く

グラフで表現する

例 1 の場合




## 例 2

## 例 2

- ▶  $A = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$
- ▶ 任意の  $X, Y \in A$  に対して

$X \subseteq Y$  であることを  $X$  は  $Y$  の部分集合である

と定義する




## 例 3

## 例 3

- ▶  $A = \left\{ \begin{array}{c} \text{◇} \text{◇} \\ \text{P} \quad \text{Q} \end{array}, \begin{array}{c} \text{◇} \text{◇} \\ \text{P} \quad \text{Q} \end{array}, \begin{array}{c} \text{◇} \text{◇} \\ \text{P} \quad \text{Q} \end{array}, \begin{array}{c} \text{◇} \text{◇} \\ \text{P} \quad \text{Q} \end{array} \right\}$
- ▶ 任意の  $X, Y \in A$  に対して

$X \preceq Y$  であることを  $X$  は  $Y$  の上に来ない

と定義する




## 例 4

## 例 4

- ▶  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- ▶ 任意の  $x, y \in A$  に対して

$x < y$  であることを  $x$  は  $y$  より小さい

と定義する




## 例 5

## 例 5

- ▶  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- ▶ 任意の  $x, y \in A$  に対して

$x = y$  であることを  $x$  は  $y$  と等しい

と定義する




## 例 6

## 例 6

- ▶  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- ▶ 任意の  $x, y \in A$  に対して

$$x \equiv_3 y \text{ であることを } x \equiv y \pmod{3}$$

と定義する



## 補足：合同な整数

## 合同な整数

0以上の整数  $m, n$  と 1以上の整数  $p$  を考える

- ▶  $m - n$  が  $p$  で割り切れるとき，すなわち，ある整数  $q$  が存在して

$$m - n = pq$$

と書けるとき， $m \equiv n \pmod{p}$  と表記する

- ▶  $m \equiv n \pmod{p}$  であるとき  
「 $m$  と  $n$  は  $p$  を法として合同である」という

例：

- ▶ 5 と 11 は 3 を法として合同である
  - ▶  $\because 5 - 11 = -6 = -2 \cdot 3$
- ▶ 15869 と 6832 は 1291 を法として合同である
  - ▶  $\because 15869 - 6832 = 9037 = 7 \cdot 1291$


# 目次

- ① 共通点は何？
- ② 関係
- ③ 関係の性質**
- ④ 順序と同値関係
- ⑤ 今日のまとめ





## 反射性

集合  $A$  と  $A$  上の関係  $R$ 


反射性とは？

 $R$  が**反射性**を持つとは，次を満たすこと任意の  $x \in A$  に対して  $x R x$ 


# 反射性を持つのはどれ？




## 反射性を持つのはどれ？




持つ



持たない



持つ






持つ





## 完全性

集合  $A$  と  $A$  上の関係  $R$ 


完全性とは？

 $R$  が完全性を持つとは，次を満たすこと任意の  $x, y \in A$  に対して  $xRy$  または  $yRx$ 


# 完全性を持つのはどれ？




## 完全性を持つのはどれ？




持たない



持たない



持たない







持たない





## 対称性

集合  $A$  と  $A$  上の関係  $R$ 


対称性とは？

 $R$  が対称性を持つとは，次を満たすこと任意の  $x, y \in A$  に対して  $xRy$  ならば  $yRx$ 


# 対称性を持つのはどれ？




## 対称性を持つのはどれ？




持たない



持たない



持つ




持つ





## 反対称性

集合  $A$  と  $A$  上の関係  $R$ 


反対称性とは？

 $R$  が**反対称性**を持つとは、次を満たすこと任意の  $x, y \in A$  に対して  $xRy$  かつ  $yRx$  ならば  $x = y$ 


# 反対称性を持つのはどれ？




# 反対称性を持つのはどれ？




持つ



持つ



持つ




持たない





## 推移性

集合  $A$  と  $A$  上の関係  $R$ 


推移性とは？

 $R$  が推移性を持つとは，次を満たすこと任意の  $x, y, z \in A$  に対して  $xRy$  かつ  $yRz$  ならば  $xRz$ 


# 推移性を持つのはどれ？




# 推移性を持つのはどれ？




持つ



持つ



持つ



持つ

# 目次

- ① 共通点は何？
- ② 関係
- ③ 関係の性質
- ④ 順序と同値関係**
- ⑤ 今日のまとめ

## 半順序

集合  $A$  と  $A$  上の関係  $R$

### 半順序とは？

$R$  が半順序であるとは，次を満たすこと

- ▶  $R$  は反射性を持つ
- ▶  $R$  は反対称性を持つ
- ▶  $R$  は推移性を持つ

例 1 ~ 6 の中で，例 1, 2, 3 は半順序

## 代表的な半順序 (1)

## 代表的な半順序 (1) : 実数の大小関係

$\mathbb{R}$  上の関係  $\leq$  を, 任意の  $x, y \in \mathbb{R}$  に対して

$x \leq y$  であることは  $x$  が  $y$  以下であること

として定義する

## 代表的な半順序 (1)

## 代表的な半順序 (1) : 実数の大小関係

$\mathbb{R}$  上の関係  $\leq$  を, 任意の  $x, y \in \mathbb{R}$  に対して

$x \leq y$  であることは  $x$  が  $y$  以下であること

として定義する

## 反射性 : 確認

任意の  $x \in \mathbb{R}$  に対して,  $x \leq x$

## 反対称性 : 確認

任意の  $x, y \in \mathbb{R}$  に対して,  $x \leq y$  かつ  $y \leq x$  ならば  $x = y$

## 推移性 : 確認

任意の  $x, y, z \in \mathbb{R}$  に対して,  $x \leq y$  かつ  $y \leq z$  ならば  $x \leq z$

## 代表的な半順序 (2)

## 代表的な半順序 (2) : 集合の包含関係

任意の集合  $A$  の冪集合  $2^A$  上の関係  $\subseteq$  を, 任意の  $X, Y \in 2^A$  に対して

$X \subseteq Y$  であることは  $X$  が  $Y$  の部分集合であること

として定義する

## 代表的な半順序 (2)

## 代表的な半順序 (2) : 集合の包含関係

任意の集合  $A$  の冪集合  $2^A$  上の関係  $\subseteq$  を, 任意の  $X, Y \in 2^A$  に対して

$X \subseteq Y$  であることは  $X$  が  $Y$  の部分集合であること

として定義する

## 反射性 : 確認 (演習問題 5.10 参照)

任意の  $X \in 2^A$  に対して,  $X \subseteq X$

## 反対称性 : 確認

任意の  $X, Y \in 2^A$  に対して,  $X \subseteq Y$  かつ  $Y \subseteq X$  ならば  $X = Y$

## 推移性 : 確認 (演習問題 5.11 参照)

任意の  $X, Y, Z \in 2^A$  に対して,  $X \subseteq Y$  かつ  $Y \subseteq Z$  ならば  $X \subseteq Z$

## 代表的な半順序 (3)

## 代表的な半順序 (3) : 整数の整除関係

1 以上の整数全体の集合  $\mathbb{Z}_+$  上の関係  $|$  を, 任意の  $a, b \in \mathbb{Z}_+$  に対して

$a | b$  であることは  $a$  が  $b$  の約数であること

として定義する

## 代表的な半順序 (3)

## 代表的な半順序 (3) : 整数の整除関係

1 以上の整数全体の集合  $\mathbb{Z}_+$  上の関係  $|$  を, 任意の  $a, b \in \mathbb{Z}_+$  に対して

$a | b$  であることは  $a$  が  $b$  の約数であること

として定義する

## 反射性 : 確認

任意の  $a \in \mathbb{Z}_+$  に対して,  $a | a$

## 反対称性 : 確認

任意の  $a, b \in \mathbb{Z}_+$  に対して,  $a | b$  かつ  $b | a$  ならば  $a = b$

## 推移性 : 確認

任意の  $a, b, c \in \mathbb{Z}_+$  に対して,  $a | b$  かつ  $b | c$  ならば  $a | c$

## 代表的な半順序 (3) : 反対称性の証明

- ▶  $a, b \in \mathbb{Z}_+$  を任意に選ぶ .
- ▶  $a \mid b$  と  $b \mid a$  を仮定する .

▶  $a = b$



## 代表的な半順序 (3) : 反対称性の証明

- ▶  $a, b \in \mathbb{Z}_+$  を任意に選ぶ .
- ▶  $a \mid b$  と  $b \mid a$  を仮定する .
- ▶  $a \mid b$  から , ある  $p \in \mathbb{Z}_+$  が存在して ,  $b = ap$

▶  $a = b$



## 代表的な半順序 (3) : 反対称性の証明

- ▶  $a, b \in \mathbb{Z}_+$  を任意に選ぶ .
- ▶  $a \mid b$  と  $b \mid a$  を仮定する .
- ▶  $a \mid b$  から , ある  $p \in \mathbb{Z}_+$  が存在して ,  $b = ap$
- ▶  $b \mid a$  から , ある  $q \in \mathbb{Z}_+$  が存在して ,  $a = bq$

▶  $a = b$



## 代表的な半順序 (3) : 反対称性の証明

- ▶  $a, b \in \mathbb{Z}_+$  を任意に選ぶ .
- ▶  $a \mid b$  と  $b \mid a$  を仮定する .
- ▶  $a \mid b$  から , ある  $p \in \mathbb{Z}_+$  が存在して ,  $b = ap$
- ▶  $b \mid a$  から , ある  $q \in \mathbb{Z}_+$  が存在して ,  $a = bq$
- ▶ したがって ,  $b = ap = (bq)p = bqp$

▶ 
$$a = b$$



## 代表的な半順序 (3) : 反対称性の証明

- ▶  $a, b \in \mathbb{Z}_+$  を任意に選ぶ .
- ▶  $a \mid b$  と  $b \mid a$  を仮定する .
- ▶  $a \mid b$  から , ある  $p \in \mathbb{Z}_+$  が存在して ,  $b = ap$
- ▶  $b \mid a$  から , ある  $q \in \mathbb{Z}_+$  が存在して ,  $a = bq$
- ▶ したがって ,  $b = ap = (bq)p = bqp$
- ▶  $p, q \in \mathbb{Z}_+$  なので ,  $p = 1, q = 1$
- ▶ 
$$a = b$$



## 代表的な半順序 (3) : 反対称性の証明

- ▶  $a, b \in \mathbb{Z}_+$  を任意に選ぶ .
- ▶  $a \mid b$  と  $b \mid a$  を仮定する .
- ▶  $a \mid b$  から , ある  $p \in \mathbb{Z}_+$  が存在して ,  $b = ap$
- ▶  $b \mid a$  から , ある  $q \in \mathbb{Z}_+$  が存在して ,  $a = bq$
- ▶ したがって ,  $b = ap = (bq)p = bqp$
- ▶  $p, q \in \mathbb{Z}_+$  なので ,  $p = 1, q = 1$
- ▶  $a = bq$  なので ,  $a = b$



## 代表的な半順序 (3) : 推移性の証明

- ▶  $a, b, c \in \mathbb{Z}_+$  を任意に選ぶ .
- ▶  $a \mid b$  と  $b \mid c$  を仮定する .

- ▶ したがって ,  $a \mid c$  .



## 代表的な半順序 (3) : 推移性の証明

- ▶  $a, b, c \in \mathbb{Z}_+$  を任意に選ぶ .
  - ▶  $a \mid b$  と  $b \mid c$  を仮定する .
  - ▶  $a \mid b$  から , ある  $p \in \mathbb{Z}_+$  が存在して ,  $b = ap$
  - ▶  $b \mid c$  から , ある  $q \in \mathbb{Z}_+$  が存在して ,  $c = bq$
- 
- ▶ したがって , ある  $r \in \mathbb{Z}_+$  が存在して ,  $c = ar$
  - ▶ したがって ,  $a \mid c$  .



## 代表的な半順序 (3) : 推移性の証明

- ▶  $a, b, c \in \mathbb{Z}_+$  を任意に選ぶ .
- ▶  $a \mid b$  と  $b \mid c$  を仮定する .
- ▶  $a \mid b$  から , ある  $p \in \mathbb{Z}_+$  が存在して ,  $b = ap$
- ▶  $b \mid c$  から , ある  $q \in \mathbb{Z}_+$  が存在して ,  $c = bq$
- ▶ したがって ,  $c = bq = (ap)q = a(pq)$
  
- ▶ したがって , ある  $r \in \mathbb{Z}_+$  が存在して ,  $c = ar$
- ▶ したがって ,  $a \mid c$  .



## 代表的な半順序 (3) : 推移性の証明

- ▶  $a, b, c \in \mathbb{Z}_+$  を任意に選ぶ .
- ▶  $a \mid b$  と  $b \mid c$  を仮定する .
- ▶  $a \mid b$  から , ある  $p \in \mathbb{Z}_+$  が存在して ,  $b = ap$
- ▶  $b \mid c$  から , ある  $q \in \mathbb{Z}_+$  が存在して ,  $c = bq$
- ▶ したがって ,  $c = bq = (ap)q = a(pq)$
- ▶  $p, q \in \mathbb{Z}_+$  なので ,  $pq \in \mathbb{Z}_+$
  
- ▶ したがって , ある  $r \in \mathbb{Z}_+$  が存在して ,  $c = ar$
- ▶ したがって ,  $a \mid c$  .



## 代表的な半順序 (3) : 推移性の証明

- ▶  $a, b, c \in \mathbb{Z}_+$  を任意に選ぶ .
- ▶  $a \mid b$  と  $b \mid c$  を仮定する .
- ▶  $a \mid b$  から , ある  $p \in \mathbb{Z}_+$  が存在して ,  $b = ap$
- ▶  $b \mid c$  から , ある  $q \in \mathbb{Z}_+$  が存在して ,  $c = bq$
- ▶ したがって ,  $c = bq = (ap)q = a(pq)$
- ▶  $p, q \in \mathbb{Z}_+$  なので ,  $pq \in \mathbb{Z}_+$
- ▶  $r' = pq$  とすると ,  $r' \in \mathbb{Z}_+$  かつ  $c = ar'$
- ▶ したがって , ある  $r \in \mathbb{Z}_+$  が存在して ,  $c = ar$
- ▶ したがって ,  $a \mid c$  .



## 全順序

集合  $A$  と  $A$  上の関係  $R$

### 全順序とは？

$R$  が**全順序**であるとは，次を満たすこと

- ▶  $R$  は反射性を持つ
- ▶  $R$  は反対称性を持つ
- ▶  $R$  は推移性を持つ
- ▶  $R$  は完全性を持つ

例 1~6 の中に，全順序はない

- ▶ 注：単に「順序」と言ったら，普通は「半順序」のことを指す
- ▶ 注：全順序のことを**線形順序**と呼ぶこともある

## 代表的な全順序

## 代表的な全順序：実数の大小関係

$\mathbb{R}$  上の関係  $\leq$  を，任意の  $x, y \in \mathbb{R}$  に対して

$x \leq y$  であることは  $x$  が  $y$  以下であること

として定義する

反射性，反対称性，推移性は既に確認した

## 完全性：確認

任意の  $x, y \in \mathbb{R}$  に対して， $x \leq y$  か  $y \leq x$

## 同値関係

集合  $A$  と  $A$  上の関係  $R$

### 同値関係とは？

$R$  が同値関係であるとは、次を満たすこと

- ▶  $R$  は反射性を持つ
- ▶  $R$  は対称性を持つ
- ▶  $R$  は推移性を持つ

例 1 ~ 6 の中で、同値関係は例 5, 6

## 代表的な同値関係 (1)

## 代表的な同値関係 (1) : 実数の相等関係

$\mathbb{R}$  上の関係  $=$  を, 任意の  $x, y \in \mathbb{R}$  に対して

$x = y$  であることは  $x$  が  $y$  と等しいこと

として定義する

## 代表的な同値関係 (1)

## 代表的な同値関係 (1) : 実数の相等関係

$\mathbb{R}$  上の関係  $=$  を, 任意の  $x, y \in \mathbb{R}$  に対して

$x = y$  であることは  $x$  が  $y$  と等しいこと

として定義する

## 反射性 : 確認

任意の  $x \in \mathbb{R}$  に対して,  $x = x$

## 対称性 : 確認

任意の  $x, y \in \mathbb{R}$  に対して,  $x = y$  ならば  $y = x$

## 推移性 : 確認

任意の  $x, y, z \in \mathbb{R}$  に対して,  $x = y$  かつ  $y = z$  ならば  $x = z$

## 代表的な同値関係 (2)

## 代表的な同値関係 (2) : 整数の合同関係

1 以上の任意の整数  $p$  に対して,  
0 以上の整数全体の集合  $\mathbb{N}$  上の関係  $\equiv_p$  を, 任意の  $m, n \in \mathbb{N}$  に対して

$$m \equiv_p n \text{ であることは } m \equiv n \pmod{p} \text{ が成り立つこと}$$

として定義する

## 代表的な同値関係 (2)

## 代表的な同値関係 (2) : 整数の合同関係

1 以上の任意の整数  $p$  に対して,  
0 以上の整数全体の集合  $\mathbb{N}$  上の関係  $\equiv_p$  を, 任意の  $m, n \in \mathbb{N}$  に対して

$$m \equiv_p n \text{ であることは } m \equiv n \pmod{p} \text{ が成り立つこと}$$

として定義する

## 反射性 : 確認

任意の  $n \in \mathbb{N}$  に対して,  $n \equiv_p n$

## 対称性 : 確認

任意の  $m, n \in \mathbb{N}$  に対して,  $m \equiv_p n$  ならば  $n \equiv_p m$

## 推移性 : 確認

任意の  $l, m, n \in \mathbb{N}$  に対して,  $l \equiv_p m$  かつ  $m \equiv_p n$  ならば  $l \equiv_p n$

## 代表的な同値関係 (2) : 反射性の証明

- ▶ 任意に  $n \in \mathbb{N}$  を選ぶ
- ▶ このとき,  $n - n = 0 = p \cdot 0$
- ▶ したがって,  $n \equiv n \pmod{p}$



$m \equiv n \pmod{p}$  の定義 (再掲)

ある  $q \in \mathbb{Z}$  が存在して,  $m - n = pq$

## 代表的な同値関係 (2) : 対称性の証明

- ▶ 任意に  $m, n \in \mathbb{N}$  を選ぶ
- ▶  $m \equiv n \pmod{p}$  と仮定する
  
- ▶ したがって,  $n \equiv m \pmod{p}$  □

$m \equiv n \pmod{p}$  の定義 (再掲)

ある  $q \in \mathbb{Z}$  が存在して,  $m - n = pq$

## 代表的な同値関係 (2) : 対称性の証明

- ▶ 任意に  $m, n \in \mathbb{N}$  を選ぶ
- ▶  $m \equiv n \pmod{p}$  と仮定する
- ▶ このとき, ある  $q \in \mathbb{Z}$  が存在して,  $m - n = pq$
  
- ▶ したがって,  $n \equiv m \pmod{p}$  □

$m \equiv n \pmod{p}$  の定義 (再掲)

ある  $q \in \mathbb{Z}$  が存在して,  $m - n = pq$

## 代表的な同値関係 (2) : 対称性の証明

- ▶ 任意に  $m, n \in \mathbb{N}$  を選ぶ
- ▶  $m \equiv n \pmod{p}$  と仮定する
- ▶ このとき, ある  $q \in \mathbb{Z}$  が存在して,  $m - n = pq$
- ▶ したがって,  $n - m = p \cdot (-q)$
- ▶ したがって,  $n \equiv m \pmod{p}$



$m \equiv n \pmod{p}$  の定義 (再掲)

ある  $q \in \mathbb{Z}$  が存在して,  $m - n = pq$

## 代表的な同値関係 (2) : 推移性の証明

- ▶ 任意に  $l, m, n \in \mathbb{N}$  を選ぶ
- ▶  $l \equiv m \pmod{p}$  および  $m \equiv n \pmod{p}$  と仮定する

- ▶ したがって,  $l \equiv n \pmod{p}$



$m \equiv n \pmod{p}$  の定義 (再掲)

ある  $q \in \mathbb{Z}$  が存在して,  $m - n = pq$

## 代表的な同値関係 (2) : 推移性の証明

- ▶ 任意に  $l, m, n \in \mathbb{N}$  を選ぶ
  - ▶  $l \equiv m \pmod{p}$  および  $m \equiv n \pmod{p}$  と仮定する
  - ▶  $l \equiv m \pmod{p}$  から, ある  $q_1 \in \mathbb{Z}$  が存在して,  $l - m = pq_1$
- 
- ▶ したがって,  $l \equiv n \pmod{p}$  □

$m \equiv n \pmod{p}$  の定義 (再掲)

ある  $q \in \mathbb{Z}$  が存在して,  $m - n = pq$

## 代表的な同値関係 (2) : 推移性の証明

- ▶ 任意に  $l, m, n \in \mathbb{N}$  を選ぶ
  - ▶  $l \equiv m \pmod{p}$  および  $m \equiv n \pmod{p}$  と仮定する
  - ▶  $l \equiv m \pmod{p}$  から, ある  $q_1 \in \mathbb{Z}$  が存在して,  $l - m = pq_1$
  - ▶  $m \equiv n \pmod{p}$  から, ある  $q_2 \in \mathbb{Z}$  が存在して,  $m - n = pq_2$
- 
- ▶ したがって,  $l \equiv n \pmod{p}$  □

$m \equiv n \pmod{p}$  の定義 (再掲)

ある  $q \in \mathbb{Z}$  が存在して,  $m - n = pq$

## 代表的な同値関係 (2) : 推移性の証明

- ▶ 任意に  $l, m, n \in \mathbb{N}$  を選ぶ
- ▶  $l \equiv m \pmod{p}$  および  $m \equiv n \pmod{p}$  と仮定する
- ▶  $l \equiv m \pmod{p}$  から, ある  $q_1 \in \mathbb{Z}$  が存在して,  $l - m = pq_1$
- ▶  $m \equiv n \pmod{p}$  から, ある  $q_2 \in \mathbb{Z}$  が存在して,  $m - n = pq_2$
- ▶ したがって,  $l - n = (l - m) + (m - n) = pq_1 + pq_2 = p(q_1 + q_2)$
  
- ▶ したがって,  $l \equiv n \pmod{p}$  □

$m \equiv n \pmod{p}$  の定義 (再掲)

ある  $q \in \mathbb{Z}$  が存在して,  $m - n = pq$

## 代表的な同値関係 (2) : 推移性の証明

- ▶ 任意に  $l, m, n \in \mathbb{N}$  を選ぶ
- ▶  $l \equiv m \pmod{p}$  および  $m \equiv n \pmod{p}$  と仮定する
- ▶  $l \equiv m \pmod{p}$  から, ある  $q_1 \in \mathbb{Z}$  が存在して,  $l - m = pq_1$
- ▶  $m \equiv n \pmod{p}$  から, ある  $q_2 \in \mathbb{Z}$  が存在して,  $m - n = pq_2$
- ▶ したがって,  $l - n = (l - m) + (m - n) = pq_1 + pq_2 = p(q_1 + q_2)$
- ▶  $q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$  より,  $q_1 + q_2 \in \mathbb{Z}$
- ▶ したがって,  $l \equiv n \pmod{p}$  □

$m \equiv n \pmod{p}$  の定義 (再掲)

ある  $q \in \mathbb{Z}$  が存在して,  $m - n = pq$

# 目次

- ① 共通点は何？
- ② 関係
- ③ 関係の性質
- ④ 順序と同値関係
- ⑤ 今日のまとめ

## 今日のまとめ

## 関係とそれにまつわる概念

- ▶ 関係を理解する
  - ▶ 関係の性質を理解する
    - ▶ 反射性, 完全性, 対称性, 反対称性, 推移性
  - ▶ 特殊な関係を理解する
    - ▶ 順序 (半順序), 全順序, 同値関係
- 
- ▶ 登場した「関係」は「2つのものの間の関係」だけだった
  - ▶ 3つのものの間の関係は？
  - ▶ それ以上のものの間の関係は？

## $n$ 項関係とは？

### $n$ 項関係とは？（常識に基づく定義）

$A$  上の  $n$ 項関係は次のように定められるもの

- ▶ 関係を表す関数「 $A^n \rightarrow \{ \quad, \times \}$ 」がある
- ▶ 任意の  $(x_1, \dots, x_n) \in A^n$  に対して  
その関数の値が「 $\quad$ 」か「 $\times$ 」のどちらかに決まる

この一般化の下で、講義で扱った「関係」は「**二項関係**」と呼ばれる。

# 目次

- ① 共通点は何？
- ② 関係
- ③ 関係の性質
- ④ 順序と同値関係
- ⑤ 今日のまとめ