

離散数理工学 第9回
離散確率論：確率的離散システムの解析

岡本 吉央
okamotoy@uec.ac.jp

電気通信大学

2016年12月6日

最終更新：2016年12月19日 13:30

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (9)

2016年12月6日 1 / 43

スケジュール 後半 (予定)

- 8 離散確率論：確率の復習と確率不等式 (12/6)
- ★ 中間試験 (12/13)
- 9 離散確率論：確率的離散システムの解析 (12/20)
- 10 離散確率論：乱択データ構造とアルゴリズム (基礎) (1/10)
- 11 離散確率論：乱択データ構造とアルゴリズム (発展) (1/17)
- 12 離散確率論：マルコフ連鎖 (基礎) (1/24)
- 13 離散確率論：マルコフ連鎖 (発展) (1/31)
- ★ 予備日 (2/7)
- ★ 期末試験 (2/14?)

注意：予定の変更もありうる

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (9)

2016年12月6日 3 / 43

目次

- 1 不公平な硬貨投げ
- 2 クーボン収集問題
- 3 誕生日のパラドックス
- 4 今日のまとめ

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (9)

2016年12月6日 5 / 43

不公平な硬貨投げ

不公平な硬貨投げ：表が出続ける確率は？

- ▶ $E_i = i$ 回目に表が出る (事象)
- ▶ このとき、 E_1, \dots, E_n は互いに独立なので

$$\begin{aligned} \Pr(\text{表が } n \text{ 回出る}) &= \Pr(E_1 \text{ かつ } E_2 \text{ かつ } \dots \text{ かつ } E_n) \\ &= \Pr(E_1) \cdot \Pr(E_2) \cdot \dots \cdot \Pr(E_n) \\ &= p \cdot p \cdot \dots \cdot p \\ &= p^n \end{aligned}$$

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (9)

2016年12月6日 7 / 43

スケジュール 前半 (予定)

- 1 数え上げの基礎：二項係数と二項定理 (10/4)
- ★ 休講 (体育祭) (10/11)
- 2 数え上げの基礎：漸化式の立て方 (10/18)
- 3 数え上げの基礎：漸化式の解き方 (基礎) (10/25)
- 4 数え上げの基礎：漸化式の解き方 (発展) (11/1)
- ★ 休講 (出張) (11/8)
- 5 離散代数：対称群と置換群 (11/15)
- 6 離散代数：有限群 (11/22)
- 7 離散代数：有限群の応用 (11/29)

注意：予定の変更もありうる

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (9)

2016年12月6日 2 / 43

今日の目標

今日の目標

典型的な確率的離散システムの解析ができるようになる

- ▶ 不公平な硬貨投げ
- ▶ クーボン収集問題
- ▶ 誕生日のパラドックス

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (9)

2016年12月6日 4 / 43

不公平な硬貨投げ：設定

不公平な硬貨投げ

次のような硬貨 (コイン) を1つ投げる

- ▶ 表の出る確率 = p
- ▶ 裏の出る確率 = $1 - p$

ただし、 $0 < p \leq 1$

典型的な問題：この硬貨を続けて何回か独立に投げる

- 1 n 回投げて、表が n 回出る確率は？
- 2 n 回投げて、表が一度も出ない確率は？
- 3 n 回投げて、表が一度は出る確率は？
- 4 n 回投げて、表が出る回数の期待値は？
- 5 表が出るまで投げ続けるとき、投げる回数の期待値は？

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (9)

2016年12月6日 6 / 43

不公平な硬貨投げ

不公平な硬貨投げ：表が一度も出ない確率は？

- ▶ $\bar{E}_i = i$ 回目に裏が出る (事象)
- ▶ このとき、 $\bar{E}_1, \dots, \bar{E}_n$ は互いに独立なので

$$\begin{aligned} \Pr(n \text{ 回中、表が一度も出ない}) &= \Pr(\bar{E}_1 \text{ かつ } \dots \text{ かつ } \bar{E}_n) \\ &= \Pr(\bar{E}_1) \cdot \dots \cdot \Pr(\bar{E}_n) \\ &= (1 - p) \cdot \dots \cdot (1 - p) \\ &= (1 - p)^n \end{aligned}$$

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (9)

2016年12月6日 8 / 43

不公平な硬貨投げ：表が一度は出る確率は？

- ▶ 「表が一度は出る」という事象は
「表が一度も出ない」という事象の余事象
- ▶ したがって、

$$\begin{aligned} \Pr(n \text{ 回中, 表が一度は出る}) &= 1 - \Pr(n \text{ 回中, 表が一度も出ない}) \\ &= 1 - (1-p)^n \end{aligned}$$

(補足) 不公平な硬貨投げ：表が出る回数の期待値は？

— 標示確率変数を使わなかったら…

- ▶ $F_j = n$ 回の中で j 回表が出る (事象)
- ▶ このとき、 $\Pr(F_j) = \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j}$
- ▶ したがって、

$$\begin{aligned} E[n \text{ 回中, 表が出る回数}] &= \sum_{j=0}^n j \cdot \Pr(F_j) = \sum_{j=0}^n j \cdot \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j} \\ &= np(p + (1-p))^{n-1} = pn \end{aligned}$$

ここで

(演習問題)

$$nx(x+y)^{n-1} = \sum_{j=0}^n j \binom{n}{j} x^j y^{n-j}$$

不公平な硬貨投げ：表が出る回数が期待値から離れる確率は？

- ▶ 次の確率変数を考える (事象 E_i の標示確率変数と呼ばれる)

$$X_i = \begin{cases} 1 & (E_i \text{ が生起する, つまり, } i \text{ 回目に表が出る}) \\ 0 & (E_i \text{ が生起しない, つまり, } i \text{ 回目に裏が出る}) \end{cases}$$

- ▶ このとき、

$$\begin{aligned} E[n \text{ 回中, 表が出る回数}] &= E[X_1 + \dots + X_n] \\ &= E[X_1] + \dots + E[X_n] = pn \end{aligned}$$

次の確率はどれくらい小さいか？ (または大きいか？)

$$\Pr(X_1 + \dots + X_n \geq 2pn)$$

不公平な硬貨投げ：チェルノフ上界の技法

マルコフの不等式より

$$\begin{aligned} \Pr(X_1 + \dots + X_n \geq 2pn) &= \Pr(2^{X_1 + \dots + X_n} \geq 2^{2pn}) \\ &\leq \frac{E[2^{X_1 + \dots + X_n}]}{2^{2pn}} \end{aligned}$$

よって、 $E[2^{X_1 + \dots + X_n}]$ を知りたい

不公平な硬貨投げ：表が出る回数の期待値は？

- ▶ 次の確率変数を考える (事象 E_i の標示確率変数と呼ばれる)

$$X_i = \begin{cases} 1 & (E_i \text{ が生起する, つまり, } i \text{ 回目に表が出る}) \\ 0 & (E_i \text{ が生起しない, つまり, } i \text{ 回目に裏が出る}) \end{cases}$$

- ▶ このとき、 $E[X_i] = 1 \cdot p + 0 \cdot (1-p) = p$

- ▶ したがって、

$$\begin{aligned} E[n \text{ 回中, 表が出る回数}] &= E[X_1 + \dots + X_n] \\ &= E[X_1] + \dots + E[X_n] = pn \end{aligned}$$

不公平な硬貨投げ：表が出るまで投げ続けるとき、投げる回数の期待値は？

- ▶ $A_i = 1$ 回目から $i-1$ 回目まですべて裏で、 i 回目で表が出る (事象)
- ▶ このとき、

$$\begin{aligned} \Pr(A_i) &= \Pr(\overline{E_1} \text{ かつ } \dots \text{ かつ } \overline{E_{i-1}} \text{ かつ } E_i) \\ &= \Pr(\overline{E_1}) \cdot \dots \cdot \Pr(\overline{E_{i-1}}) \cdot \Pr(E_i) \\ &= (1-p)^{i-1} p \end{aligned}$$

- ▶ したがって、

$$\begin{aligned} \text{求める期待値} &= \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot \Pr(A_i) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot (1-p)^{i-1} p \\ &= \frac{1}{p} \quad (\text{詳細は演習問題}) \end{aligned}$$

不公平な硬貨投げ：マルコフの不等式

マルコフの不等式より

$$\Pr(X_1 + \dots + X_n \geq 2pn) \leq \frac{E[X_1 + \dots + X_n]}{2pn} = \frac{pn}{2pn} = \frac{1}{2}$$

「とても小さい」ということが証明できない

マルコフの不等式

(復習)

自然数値確率変数 $X \geq 0$ と正実数 $t > 0$ に対して、 $E[X]$ が存在するとき

$$\Pr(X \geq t) \leq \frac{E[X]}{t}$$

不公平な硬貨投げ：チェルノフ上界の技法 (2)

 X_1, \dots, X_n は互いに独立なので、 $2^{X_1}, \dots, 2^{X_n}$ も互いに独立であり、

$$\begin{aligned} E[2^{X_1 + \dots + X_n}] &= E\left[\prod_{i=1}^n 2^{X_i}\right] \\ &= \prod_{i=1}^n E[2^{X_i}] \quad \leftarrow \text{独立性を利用} \end{aligned}$$

ここで、任意の i に対して

$$E[2^{X_i}] = 2^1 \cdot p + 2^0 \cdot (1-p) = 2p + (1-p) = 1+p$$

ゆえに、

$$E[2^{X_1 + \dots + X_n}] = \prod_{i=1}^n E[2^{X_i}] = (1+p)^n$$

まとめると、

$$\begin{aligned} \Pr(X_1 + \dots + X_n \geq 2pn) &\leq \frac{E[2^{X_1 + \dots + X_n}]}{2^{2pn}} \\ &= \frac{(1+p)^n}{2^{2pn}} = \left(\frac{1+p}{4p}\right)^n \end{aligned}$$

- ▶ 右辺は n が大きくなるにつれて小さくなる
- ▶ $p = 1/2$ のとき、右辺 = $(3/4)^n$

疑問

- ▶ 疑問： X_i から 2^{X_i} を作ったが、「2」でないといけないのか？
- ▶ 回答：「2」でなくてもよい。1 より大きければよい

例えば、2 ではなく、3 にすると、

$$\begin{aligned} \Pr(X_1 + \dots + X_n \geq 2pn) &\leq \frac{E[3^{X_1 + \dots + X_n}]}{3^{2pn}} \\ &= \frac{(1+2p)^n}{3^{2pn}} = \left(\frac{1+2p}{9p}\right)^n \end{aligned}$$

$p = 1/2$ のとき、この右辺は $(2/3)^n$

チェルノフ上界の技法： X が独立確率変数の和であるとき


- ▶ $E[X]$ の代わりに $E[c^X]$ を考えて、マルコフの不等式（など）を適用
- ▶ 上界ができる限り小さくなるように、定数 c を定める

目次

- 不公平な硬貨投げ
- クーポン収集問題
- 誕生日のパラドックス
- 今日のまとめ

クーポン収集問題：シミュレーション

景品数 20 の場合



10000 回の試行：購入商品数平均 = 72.0825

クーポン収集問題：期待値 (続き)

- ▶ 購入商品数 = $X_0 + X_1 + \dots + X_{n-1}$ なので、

$$\begin{aligned} E[\text{購入商品数}] &= E[X_0 + X_1 + \dots + X_{n-1}] \\ &= E[X_0] + E[X_1] + \dots + E[X_{n-1}] \\ &= \frac{n}{n} + \frac{n}{n-1} + \dots + \frac{n}{1} \\ &= n \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \end{aligned}$$

調和数とは？

第 n 調和数とは、次で定義される数 H_n のこと

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

クーポン収集問題：期待値

考え方：商品を次々と買うとき、既にいくつ景品を持っているか考慮する

- ▶ $\Pr(\text{新しい景品が当たる} \mid \text{既に景品を } j \text{ 個所持}) = \frac{n-j}{n}$

ここで、次の確率変数を考える

$$X_j = \begin{array}{l} \text{景品を } j \text{ 種類所持した瞬間から、} \\ \text{新しい景品が当たるまでに購入した商品の数} \end{array}$$

- ▶ 景品を j 種類所持しているとき、新しい景品が当たることは表が出る確率が $\frac{n-j}{n}$ である硬貨を投げて表が出ることとみなせる
- ▶ したがって、 $E[X_j] = \frac{n}{n-j}$


調和数の性質

調和数の上界と下界

任意の整数 $n \geq 1$ に対して

$$\ln(n+1) \leq H_n \leq 1 + \ln n$$

証明：演習問題 (ヒントは次の図)



帰結

$$H_n = \ln n + O(1)$$

- すなわち、

$$E[\text{購入商品数}] = nH_n = n \ln n + O(n)$$

- マルコフの不等式より

$$\Pr(\text{購入商品数} \geq 2nH_n) \leq \frac{E[\text{購入商品数}]}{2nH_n} = \frac{1}{2}$$

購入商品数が大きくなる確率に対して、もっと「きつい」上界が欲しい

- したがって、

$$\begin{aligned} \Pr(\text{購入商品数} > 2nH_n) &= \Pr(E_1 \text{ または } E_2 \text{ または } \dots \text{ または } E_n) \\ &\leq \sum_{i=1}^n \Pr(E_i) \\ &\leq n \cdot \frac{1}{(n+1)^2} \leq \frac{n+1}{(n+1)^2} = \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

つまり、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \Pr(\text{購入商品数} > 2nH_n) = 0$

合併上界

事象 A, B に対して

$$\Pr(A \cup B) \leq \Pr(A) + \Pr(B)$$

クーポン収集問題

設定

- 商品を買うと n 種類の景品 (クーポン) の中の 1 つが当たる
- 景品の集合 $N = \{1, \dots, n\}$
- どの景品 i に対しても、 $\Pr(\text{景品 } i \text{ が当たる}) = \frac{1}{n}$ で、これらは商品の間で同一であり、互いに独立

問題

- すべての景品を集め切るまで、何個商品を購入すればよいか?

回答

- 購入商品数の期待値は nH_n であり、
- $n \rightarrow \infty$ のとき、購入商品数は高い確率で nH_n になる

誕生日問題

10 人いる部屋の中に、誕生日が同じ 2 人はいるか? そのような 2 人がいる確率は?

仮定

- 1 年は 366 日
- 人の誕生日がそれら 366 日の間に等確率で分布する

$$\Pr(i \text{ さんの誕生日が } j) = \frac{1}{366}$$

- $E_i = 2nH_n$ 回の商品購入で景品 i が得られない (事象)
- このとき、任意の $i \in \{1, \dots, n\}$ に対して、

$$\begin{aligned} \Pr(E_i) &= \left(\frac{n-1}{n}\right)^{2nH_n} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{2nH_n} \\ &\leq \left(e^{-\frac{1}{n}}\right)^{2nH_n} = e^{-2H_n} \\ &\leq e^{-2 \ln(n+1)} = \frac{1}{(n+1)^2} \end{aligned}$$

事実：有用な不等式

(第 1 回講義より)

任意の実数 x に対して

$$1 + x \leq e^x$$

次が知られている (証明は省略：ポアソン近似とチェルノフ技法を使う)

エルデシュとレニイによる 1961 年の結果

任意の正実数 $c > 0$ に対して、

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \Pr(\text{購入商品数} > n \ln n + cn) &= 1 - e^{-e^{-c}}, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \Pr(\text{購入商品数} < n \ln n + cn) &= 1 - e^{-e^{-c}} \end{aligned}$$

つまり購入商品数 (確率変数) は、その期待値の周りに集中している

- 不公平な硬貨投げ
- クーポン収集問題
- 誕生日のパラドックス
- 今日のまとめ

まず、10 人の誕生日がすべて異なる確率を計算する


$$\Pr(10 \text{ 人の誕生日がすべて異なる}) = \frac{366 \cdot 365 \cdot \dots \cdot 357}{366^{10}} \approx 0.883$$

したがって

$$\Pr(10 \text{ 人の中に誕生日の同じ人がいる}) \approx 1 - 0.883 = 0.117$$

つまり、

- 11 % ぐらいの確率で同じ誕生日の 2 人がいる



まず、30 人の誕生日がすべて異なる確率を計算する



$$\text{▶ 30 人の誕生日がすべて異なる確率} = \frac{366 \cdot 365 \cdots 337}{366^{30}} \approx 0.295$$

したがって

$$\text{▶ 30 人の中に誕生日の同じ人がいる確率} \approx 1 - 0.295 = 0.705$$

つまり、

$$\text{▶ 70 \% ぐらいの確率で同じ誕生日の 2 人がいる}$$



設定

$$\text{▶ } k = 1 \text{ 年の日数}$$

$$\text{▶ } m = \text{部屋の人数}$$

$$\text{▶ } \Pr(i \text{ さんの誕生日が } j) = \frac{1}{k}$$

問題

1 部屋の中に同じ誕生日の 2 人がいる確率は？

2 同じ誕生日の 2 人がいる確率が $\frac{1}{2}$ を超えるのはいつ？

したがって、

$$\text{▶ } m \text{ 人の中に誕生日が同じ 2 人がいる確率} \geq 1 - e^{-\frac{m(m-1)}{2k}}$$

$$\text{▶ } m \geq \sqrt{(2 \ln 2)k} + 1 \text{ のとき, この右辺が } \frac{1}{2} \text{ 以上になる}$$

$$\text{なぜならば, } m \geq \sqrt{(2 \ln 2)k} + 1 \text{ であるとき,}$$

$$(m-1)^2 \geq (2 \ln 2)k$$

$$\therefore m(m-1) \geq (2 \ln 2)k$$

$$\therefore -\ln 2 \geq -\frac{m(m-1)}{2k}$$

$$\therefore \frac{1}{2} \geq e^{-\frac{m(m-1)}{2k}}$$

$$\therefore 1 - e^{-\frac{m(m-1)}{2k}} \geq \frac{1}{2} \text{ となるから}$$

ハッシュ

(アルゴリズム論第一の復習)

ハッシュ関数は $N = \{1, \dots, n\}$ から $K = \{1, \dots, k\}$ への関数 h (典型的には $k < n$)

▶ 性質: h が「よくかき混ぜる」関数であるとき

$$h(x) = h(y) \text{ であるならば, } x = y \text{ である可能性が高い}$$

▶ $x \neq y$ であるのに $h(x) = h(y)$ であるとき, x と y のハッシュ値が衝突 (好ましくない)

次の 2 つは同じであると見せる

▶ 要素数 m の部分集合 $S \subseteq N$ にハッシュ値の衝突する 2 要素があるか?

▶ 1 年が k 日の場合, m 人の部屋の中に誕生日の同じ 2 人がいるか?

$$\therefore m \geq \sqrt{(2 \ln 2)k} + 1 \text{ のとき, そのような 2 要素の存在確率は } \frac{1}{2} \text{ 以上}$$

まず、 m 人の誕生日がすべて異なる確率を計算する

$$\text{▶ } m \text{ 人の誕生日がすべて異なる確率} = \frac{k \cdot (k-1) \cdots (k-m+1)}{k^m}$$

▶ ここで、

$$\begin{aligned} \frac{k \cdot (k-1) \cdots (k-m+1)}{k^m} &= \prod_{i=0}^{m-1} \frac{k-i}{k} = \prod_{i=0}^{m-1} \left(1 - \frac{i}{k}\right) \\ &\leq \prod_{i=0}^{m-1} e^{-\frac{i}{k}} = e^{-\sum_{i=0}^{m-1} \frac{i}{k}} = e^{-\frac{m(m-1)}{2k}} \end{aligned}$$

事実：有用な不等式

(第 1 回講義の復習)

任意の実数 x に対して

$$1 + x \leq e^x$$

ハッシュ


(アルゴリズム論第一の復習)

ハッシュ関数は $N = \{1, \dots, n\}$ から $K = \{1, \dots, k\}$ への関数 h (典型的には $k < n$)

▶ 性質: h が「よくかき混ぜる」関数であるとき

$$h(x) = h(y) \text{ であるならば, } x = y \text{ である可能性が高い}$$

▶ $x \neq y$ であるのに $h(x) = h(y)$ であるとき, x と y のハッシュ値が衝突 (好ましくない)



- 1 不公平な硬貨投げ
- 2 クーポン収集問題
- 3 誕生日のパラドックス
- 4 今日のまとめ

今日の目標

典型的な確率的離散システムの解析ができるようになる

- ▶ 不公平な硬貨投げ
- ▶ クーボン収集問題
- ▶ 誕生日のパラドックス

- ▶ 演習問題をやる
 - ▶ 相談推奨 (ひとりでやらない)
- ▶ 質問をする
 - ▶ 教員と TA は巡回
- ▶ 退室時, 小さな紙に感想など書いて提出する ← 重要
 - ▶ 内容は何でも OK
 - ▶ 匿名で OK