

離散数学 第 8 回  
写像 (1) : 像と逆像

岡本 吉央  
okamotoy@uec.ac.jp

電気通信大学

2017 年 6 月 8 日

最終更新 : 2017 年 6 月 7 日 11:49

## スケジュール 前半

- |   |  |         |
|---|--|---------|
| 1 | 集合と論理 (1) : 命題論理                         | (4月13日) |
| 2 | 集合と論理 (2) : 集合と論理の対応                     | (4月20日) |
| 3 | 集合と論理 (3) : 述語論理                         | (4月27日) |
| * | 休講 (みどりの日)                               | (5月4日)  |
| 4 | 証明法 (1) : $\exists$ と $\forall$ を含む命題の証明 | (5月11日) |
| 5 | 証明法 (2) : 含意を含む命題の証明                     | (5月18日) |
| 6 | 証明法 (3) : 集合に関する証明                       | (5月25日) |
| 7 | 集合と論理 (4) : 直積と冪集合                       | (6月1日)  |

## スケジュール 後半 (予定)

- |    |                      |         |
|----|----------------------|---------|
| 9  | 写像 (1) : 像と逆像        | (6月8日)  |
| ●  | 中間試験                 | (6月15日) |
| 10 | 写像 (2) : 全射と単射       | (6月22日) |
| 11 | 関係 (1) : 関係          | (6月29日) |
| *  | 休講 (出張)              | (7月6日)  |
| 12 | 証明法 (4) : 数学的帰納法     | (7月13日) |
| 13 | 集合と論理 (5) : 集合の再帰的定義 | (7月20日) |
| *  | 休講 (出張)              | (7月27日) |
| ●  | 期末試験                 | (8月3日?) |

注意：予定の変更もありうる

### この講義の目標

- ▶ 語学としての数学, コミュニケーションとしての数学

### 今日の目標

- ▶ 写像 (関数) の定義と記法を理解し, 使えるようになる
- ▶ 写像による像と逆像, 写像の合成を理解する


集合

集合


集合

集合


集合



## ここまでのまとめ と ここからの話



## ここまでのまとめ と ここからの話




# 目次

- ① 写像 (関数)
- ② 像と逆像
- ③ 写像の合成
- ④ 証明の例題
- ⑤ 今日のまとめ

## 関数と言って思い浮かべるものは？ (1)

## 数学 (?) の「関数」

関数  $y = \sqrt{x}$ 

## 関数と言って思い浮かべるものは？ (2)

## プログラミングの「関数」

```
int sum(int a, int b) {  
    return a + b;  
}  
  
int absolute_value(int a) {  
    if (a < 0) {  
        return -a;  
    } else {  
        return a;  
    }  
}
```

# 写像とは

## 写像とは？

- ▶ 集合が2つある ( $A$ と $B$ とする)
- ▶  $A$ の1つ1つの要素を $B$ のある要素に「移す」

## 数学的に写像を定義すると？

- ▶ 任意の $a \in A$ に対して、ある $b \in B$ が一意に (ただ一つ) 存在して、 $a$ を $b$ に移す

## 記法は？


- ▶ 写像  $f: A \rightarrow B$
- ▶ 任意の $a \in A$ に対して、ある $b \in B$ が一意に存在して、 $f(a) = b$

注:  $f$ によって $a$ を移したものを $f(a)$ と書く

「写像」を「関数」とも呼ぶ

## 関数と言って思い浮かべるものは？ (1) 再掲

## 数学 (?) の「関数」

関数  $y = \sqrt{x}$ 

- ▶  $f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$
- ▶ 任意の  $x \in [0, +\infty)$  に対して  $f(x) = \sqrt{x}$

## 関数と言って思い浮かべるものは？ (2) 再掲

## プログラミングの「関数」

```
int sum(int a, int b) {  
    return a + b;  
}
```

- ▶  $\text{sum}: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$
- ▶ 任意の  $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  に対して  $\text{sum}((a, b)) = a + b$

**注** :  $\mathbb{Z} =$  すべての整数から成る集合 (整数全体の集合)

## 関数と言って思い浮かべるものは？ (2) 再掲 (続)

## プログラミングの「関数」

```
int absolute_value(int a) {  
    if (a < 0) {  
        return -a;  
    } else {  
        return a;  
    }  
}
```

- ▶  $\text{absolute\_value}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$
- ▶ 任意の  $a \in \mathbb{Z}$  に対して

$$\text{absolute\_value}(a) = \begin{cases} -a & (a < 0 \text{ のとき}) \\ a & (\text{そうでないとき}) \end{cases}$$

## 発展的補足：論理記号を用いて定義を書き直してみる

$f$  が  $A$  から  $B$  への写像であるとは

$$\forall a \in A (\exists! b \in B (f(a) = b))$$


「 $\exists!$ 」は「一意に存在して～」を表す記号

「 $\exists!$ 」を書き直すと

$$\forall a \in A (\exists b \in B ((f(a) = b) \wedge (\forall b' \in B (f(a) = b' \rightarrow b = b'))))$$

## 写像の例

- ▶  $A = \{1, 2, 3\}$ ,  $B = \{1, 2\}$
- ▶ 写像  $f: A \rightarrow B$  を次のように定義
  - ▶  $f(1) = 2$ ,  $f(2) = 2$ ,  $f(3) = 1$




## 注意

「写像  $f: A \rightarrow B$  を定義する」ためには、  
任意の  $a \in A$  に対して、 $f(a)$  が何であることを定めればよい

## 写像にまつわる記法と用語

集合  $A, B$  と写像  $f: A \rightarrow B$ 

- ▶  $A \xrightarrow{f} B$
- ▶  $b = f(a)$  のとき 「 $f: a \mapsto b$ 」 や 「 $a \xrightarrow{f} b$ 」
- ▶  $f(a)$  を  $a$  における  $f$  の **値** という
- ▶  $A$  を  $f$  の **始域** (または **定義域**) という
- ▶  $B$  を  $f$  の **終域** という




## 格言

写像の始域と終域を常に意識

(似たものに「行列のサイズ」がある)

問題：次の図の中で写像を表すものは？



## 2つの写像が等しいということ

集合  $A, B, C, D$  と写像  $f: A \rightarrow B, g: C \rightarrow D$

 $f$  と  $g$  が等しいとは？

写像  $f$  と  $g$  が等しいことを「 $f = g$ 」と書き、  
次の条件がすべて成り立つことと定義する

▶  $A = C$

( $f$  と  $g$  の始域が等しい)

▶  $B = D$

( $f$  と  $g$  の終域が等しい)

▶ すべての  $a \in A$  に対して、 $f(a) = g(a)$

(写像の値が等しい)

## 恒等写像


集合  $A$  と写像  $f: A \rightarrow A$

## 恒等写像とは？

$f$  が恒等写像であるとは、  
任意の  $a \in A$  に対して  $a = f(a)$  であること

- ▶  $A \rightarrow A$  の恒等写像を  $\text{id}_A$  と書くこともある
- ▶ 例 :  $A = \{1, 2, 3\}$  のとき  $f: A \rightarrow A$  で

$$f(1) = 1, \quad f(2) = 2, \quad f(3) = 3$$



# 目次

- ① 写像 (関数)
- ② 像と逆像
- ③ 写像の合成
- ④ 証明の例題
- ⑤ 今日のまとめ

## 写像による像


$f: A \rightarrow B$  を写像とする

## 像とは？

$f$  による部分集合  $X \subseteq A$  の像を  $f(X)$  と書き

$$f(X) = \{b \mid b \in B \text{ かつ, ある } a \in X \text{ が存在して } b = f(a)\}$$

例：  $f(\{1, 2, 3\})$  は？



- ▶  $6 \in f(\{1, 2, 3\})$  か?:  $6 = f(1)$  なので YES
- ▶  $7 \in f(\{1, 2, 3\})$  か?:  $7 = f(3)$  なので YES
- ▶  $8 \in f(\{1, 2, 3\})$  か?:  
 $8 \neq f(1), 8 \neq f(2), 8 \neq f(3)$  なので NO

したがって,  $f(\{1, 2, 3\}) = \{6, 7\}$

## 写像による像：他の例と注意

$f: A \rightarrow B$  を写像とする

## 像とは？


$f$  による部分集合  $X \subseteq A$  の像を  $f(X)$  と書き

$$f(X) = \{b \mid b \in B \text{ かつ, ある } a \in X \text{ が存在して } b = f(a)\}$$

## 注意

- ▶  $X$  は  $A$  の部分集合 ( $A$  の要素ではない)
- ▶  $f(X)$  は  $B$  の部分集合

## 例




- ▶  $f(\{1, 2\}) = \{6\}$
- ▶  $f(\{1, 2, 3\}) = \{6, 7\}$
- ▶  $f(\{1, 2, 3, 4\}) = \{6, 7\}$
- ▶  $f(\{1, 2, 3, 4, 5\}) = \{6, 7, 8\}$
- ▶  $f(\{2\}) = \{6\}$

## 写像による像：他の表現

 $f: A \rightarrow B$  を写像とする $f$  による  $X$  の像は次のようにも書ける


$$f(X) = \{f(a) \mid a \in X\}$$

例



- ▶  $f(\{1, 2\}) = \{f(1), f(2)\} = \{6\}$
- ▶  $f(\{1, 2, 3\}) = \{f(1), f(2), f(3)\} = \{6, 7\}$
- ▶  $f(\{1, 2, 3, 4\}) = \{f(1), f(2), f(3), f(4)\} = \{6, 7\}$
- ▶  $f(\{2\}) = \{f(2)\} = \{6\}$

## 写像による像：図による直感と補足



像の定義より、次が分かる

$$a \in X \quad \Rightarrow \quad f(a) \in f(X)$$

しかし、次が正しいとは限らない

$$f(a) \in f(X) \quad \stackrel{???}{\Rightarrow} \quad a \in X$$

## 写像による逆像


$f: A \rightarrow B$  を写像とする

## 逆像とは？

$f$  による部分集合  $Y \subseteq B$  の逆像 (または原像) を  $f^{-1}(Y)$  と書き

$$f^{-1}(Y) = \{a \mid a \in A \text{ かつ, ある } b \in Y \text{ が存在して } b = f(a)\}$$

例:  $f^{-1}(\{6, 7\})$  は？



- ▶  $1 \in f^{-1}(\{6, 7\})$  か?:  $6 = f(1)$  なので YES
- ▶  $2 \in f^{-1}(\{6, 7\})$  か?:  $6 = f(2)$  なので YES
- ▶  $3 \in f^{-1}(\{6, 7\})$  か?:  $7 = f(3)$  なので YES
- ▶  $4 \in f^{-1}(\{6, 7\})$  か?:  $7 = f(4)$  なので YES
- ▶  $5 \in f^{-1}(\{6, 7\})$  か?:  
 $6 \neq f(5), 7 \neq f(5)$  なので NO

したがって,  $f^{-1}(\{6, 7\}) = \{1, 2, 3, 4\}$

## 写像による逆像：他の例と注意

 $f: A \rightarrow B$  を写像とする

## 逆像とは？


 $f$  による部分集合  $Y \subseteq B$  の逆像 (または原像) を  $f^{-1}(Y)$  と書き

$$f^{-1}(Y) = \{a \mid a \in A \text{ かつ, ある } b \in Y \text{ が存在して } b = f(a)\}$$

## 注意

- ▶  $Y$  は  $B$  の部分集合 ( $B$  の要素ではない)
- ▶  $f^{-1}(Y)$  は  $A$  の部分集合

## 例




- ▶  $f^{-1}(\{6\}) = \{1, 2\}$
- ▶  $f^{-1}(\{6, 7\}) = \{1, 2, 3, 4\}$
- ▶  $f^{-1}(\{6, 7, 8\}) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- ▶  $f^{-1}(\{7, 8\}) = \{3, 4, 5\}$
- ▶  $f^{-1}(\{6, 8\}) = \{1, 2, 5\}$

## 写像による逆像：注意 第2弾

 $f: A \rightarrow B$  を写像とする


注意：逆像を次のようには書かない

$$f^{-1}(Y) \stackrel{?}{=} \{f^{-1}(b) \mid b \in Y\}$$



- ▶  $f^{-1}(b)$  とは？ (定義されないかも)
- ▶  $f^{-1}(b)$  が定義されるのは  $f$  が全単射であるときのみ (詳細は次回)

## 写像による逆像：図による直感と補足



逆像の定義より，次が分かる

$$f(a) \in Y \quad \Rightarrow \quad a \in f^{-1}(Y)$$

そして，次も正しい

$$a \in f^{-1}(Y) \quad \Rightarrow \quad f(a) \in Y$$

## 像と逆像：注意 (1)

$f: A \rightarrow B$  を写像とする

## 像とは？

$f$  による部分集合  $X \subseteq A$  の像を  $f(X)$  と書き

$$f(X) = \{b \mid b \in B \text{ かつ, ある } a \in X \text{ が存在して } b = f(a)\}$$

$X \subseteq A$  から  $f(X) \subseteq B$  は定まる

## 逆像とは？

$f$  による部分集合  $Y \subseteq B$  の逆像 (または原像) を  $f^{-1}(Y)$  と書き

$$f^{-1}(Y) = \{a \mid a \in A \text{ かつ, ある } b \in Y \text{ が存在して } b = f(a)\}$$

$f^{-1}(Y) \subseteq A$  は  $Y \subseteq B$  から定まる

## 像と逆像：注意 (2)

$f: A \rightarrow B$  を写像とする

## 像とは？

$f$  による部分集合  $X \subseteq A$  の像を  $f(X)$  と書き

$$f(X) = \{b \mid b \in B \text{ かつ, ある } a \in X \text{ が存在して } b = f(a)\}$$

$f$  という写像に対して、 $f(X)$  という記法が使える

## 逆像とは？

$f$  による部分集合  $Y \subseteq B$  の逆像 (または原像) を  $f^{-1}(Y)$  と書き

$$f^{-1}(Y) = \{a \mid a \in A \text{ かつ, ある } b \in Y \text{ が存在して } b = f(a)\}$$

$f$  という写像に対して、 $f^{-1}(Y)$  という記法が使える

- ▶ 「 $f^{-1}$  という写像に対して、 $f^{-1}(Y)$  という記法が使える」というわけではない
- ▶  $f$  の逆写像が存在しなくても、 $f$  による逆像は定義される (次回参照)

# 目次

- ① 写像 (関数)
- ② 像と逆像
- ③ 写像の合成**
- ④ 証明の例題
- ⑤ 今日のまとめ

## 写像の合成

集合  $A, B, C$  と写像  $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$

## 写像の合成とは？

写像  $f$  と  $g$  の合成を  $g \circ f: A \rightarrow C$  と表記し, 任意の  $x \in A$  に対して

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

とすることで定義する

注意:  $f$  の終域と  $g$  の始域が同じでないといけない  
(同じでないときは合成を定義できない)

## 写像の合成：例

- ▶  $A = \{1, 2, 3\}$ ,  $B = \{4, 5, 6, 7\}$ ,  $C = \{8, 9\}$
- ▶ 写像  $f: A \rightarrow B$  を次で定義
  - ▶  $f(1) = 5$ ,  $f(2) = 4$ ,  $f(3) = 7$
- ▶ 写像  $g: B \rightarrow C$  を次で定義
  - ▶  $g(4) = 8$ ,  $g(5) = 9$ ,  $g(6) = 9$ ,  $g(7) = 8$


このとき,  $g \circ f: A \rightarrow C$  を考えると,

$$(g \circ f)(3) = g(f(3)) = g(7) = 8$$

## 写像の合成：例 (続)

- ▶  $A = \{1, 2, 3\}$ ,  $B = \{4, 5, 6, 7\}$ ,  $C = \{8, 9\}$
- ▶ 写像  $f: A \rightarrow B$  を次で定義
  - ▶  $f(1) = 5$ ,  $f(2) = 4$ ,  $f(3) = 7$
- ▶ 写像  $g: B \rightarrow C$  を次で定義
  - ▶  $g(4) = 8$ ,  $g(5) = 9$ ,  $g(6) = 9$ ,  $g(7) = 8$


このとき,  $g \circ f: A \rightarrow C$  を考えると,



## 写像の合成：例 (続)

- ▶  $A = \{1, 2, 3\}$ ,  $B = \{4, 5, 6, 7\}$ ,  $C = \{8, 9\}$
- ▶ 写像  $f: A \rightarrow B$  を次で定義
  - ▶  $f(1) = 5$ ,  $f(2) = 4$ ,  $f(3) = 7$
- ▶ 写像  $g: B \rightarrow C$  を次で定義
  - ▶  $g(4) = 8$ ,  $g(5) = 9$ ,  $g(6) = 9$ ,  $g(7) = 8$


このとき,  $g \circ f: A \rightarrow C$  を考えると,



## 写像の合成：例 (続)

- ▶  $A = \{1, 2, 3\}$ ,  $B = \{4, 5, 6, 7\}$ ,  $C = \{8, 9\}$
- ▶ 写像  $f: A \rightarrow B$  を次で定義
  - ▶  $f(1) = 5$ ,  $f(2) = 4$ ,  $f(3) = 7$
- ▶ 写像  $g: B \rightarrow C$  を次で定義
  - ▶  $g(4) = 8$ ,  $g(5) = 9$ ,  $g(6) = 9$ ,  $g(7) = 8$


このとき,  $g \circ f: A \rightarrow C$  を考えると,



## 写像の合成：例 (続)

- ▶  $A = \{1, 2, 3\}$ ,  $B = \{4, 5, 6, 7\}$ ,  $C = \{8, 9\}$
- ▶ 写像  $f: A \rightarrow B$  を次で定義
  - ▶  $f(1) = 5$ ,  $f(2) = 4$ ,  $f(3) = 7$
- ▶ 写像  $g: B \rightarrow C$  を次で定義
  - ▶  $g(4) = 8$ ,  $g(5) = 9$ ,  $g(6) = 9$ ,  $g(7) = 8$

このとき,  $g \circ f: A \rightarrow C$  を考えると,



# 目次


- ① 写像 (関数)
- ② 像と逆像
- ③ 写像の合成
- ④ 証明の例題
- ⑤ 今日のまとめ

## 例題 1

## 例題 1 : 次を証明せよ

任意の集合  $A, B$ , 任意の写像  $f: A \rightarrow B$ , 任意の  $X, X' \subseteq A$  に対して  
 $X \subseteq X'$  ならば  $f(X) \subseteq f(X')$

図による直感



論理で書くと

$$\forall A, B, f: A \rightarrow B, X \subseteq A, X' \subseteq A (X \subseteq X' \rightarrow f(X) \subseteq f(X'))$$

## 例題 1 : 証明

証明 :

任意の集合  $A, B$ , 任意の写像  $f: A \rightarrow B$ , 任意の集合  $X, X' \subseteq A$  を考える.

したがって,  $X \subseteq X'$  ならば  $f(X) \subseteq f(X')$  となる. □

## 例題 1 : 証明

証明 :

任意の集合  $A, B$ , 任意の写像  $f: A \rightarrow B$ , 任意の集合  $X, X' \subseteq A$  を考える.

$X \subseteq X'$  であると仮定する. .... (1)

したがって,  $f(X) \subseteq f(X')$  が成り立つ.

したがって,  $X \subseteq X'$  ならば  $f(X) \subseteq f(X')$  となる. □

## 例題 1 : 証明

証明 :

任意の集合  $A, B$ , 任意の写像  $f: A \rightarrow B$ , 任意の集合  $X, X' \subseteq A$  を考える。

$X \subseteq X'$  であると仮定する。 ..... (1)

$b \in f(X)$  であると仮定する。 ..... (2)

$b \in f(X')$  が成り立つ。

したがって,  $f(X) \subseteq f(X')$  が成り立つ。

したがって,  $X \subseteq X'$  ならば  $f(X) \subseteq f(X')$  となる。 □

## 例題 1 : 証明

証明 :

任意の集合  $A, B$ , 任意の写像  $f: A \rightarrow B$ , 任意の集合  $X, X' \subseteq A$  を考える。

$X \subseteq X'$  であると仮定する。 ..... (1)

$b \in f(X)$  であると仮定する。 ..... (2)

(2) と像の定義より,

ある  $a \in X$  が存在して,  $b = f(a)$  となる。 ..... (3)

$b \in f(X')$  が成り立つ。

したがって,  $f(X) \subseteq f(X')$  が成り立つ。

したがって,  $X \subseteq X'$  ならば  $f(X) \subseteq f(X')$  となる。 □

## 例題 1 : 証明

証明 :

任意の集合  $A, B$ , 任意の写像  $f: A \rightarrow B$ , 任意の集合  $X, X' \subseteq A$  を考える。

$X \subseteq X'$  であると仮定する。 ..... (1)

$b \in f(X)$  であると仮定する。 ..... (2)

(2) と像の定義より,

ある  $a \in X$  が存在して,  $b = f(a)$  となる。 ..... (3)

(1) と (3) より,  $a \in X'$  が成り立つ。 ..... (4)

$b \in f(X')$  が成り立つ。

したがって,  $f(X) \subseteq f(X')$  が成り立つ。

したがって,  $X \subseteq X'$  ならば  $f(X) \subseteq f(X')$  となる。 □

## 例題 1 : 証明

証明 :

任意の集合  $A, B$ , 任意の写像  $f: A \rightarrow B$ , 任意の集合  $X, X' \subseteq A$  を考える。

$X \subseteq X'$  であると仮定する。 ..... (1)

$b \in f(X)$  であると仮定する。 ..... (2)

(2) と像の定義より,

ある  $a \in X$  が存在して,  $b = f(a)$  となる。 ..... (3)

(1) と (3) より,  $a \in X'$  が成り立つ。 ..... (4)

(3) と (4) より,  $b \in f(X')$  が成り立つ。

したがって,  $f(X) \subseteq f(X')$  が成り立つ。

したがって,  $X \subseteq X'$  ならば  $f(X) \subseteq f(X')$  となる。 □

# 目次

- ① 写像 (関数)
- ② 像と逆像
- ③ 写像の合成
- ④ 証明の例題
- ⑤ 今日のまとめ

## 今日の概要

### この講義の目標

- ▶ 語学としての数学, コミュニケーションとしての数学

### 今日の目標

- ▶ 写像 (関数) の定義と記法を理解し, 使えるようになる
- ▶ 写像による像と逆像, 写像の合成を理解する

## 余談：「関数」という用語

『数学の言葉づかい 100』(日本評論社, 1999 年) 58 ページより

関数の用語 *functio* は 17 世紀末ライプニッツにより初めて用いられた。

(中略)

関数がよく  $f$  で表されるのはこれにちなむもので、各国語でもこのラテン語の直訳として *function*, *Funktion*, *fonction*, (中略) などが用いられている。わが国へは中国で音訳された函数が輸入され、現在では代用漢字による関数があてられて、初等教育の段階でほぼ定着した。

## 残った時間の使い方

- ▶ 演習問題をやる
  - ▶ 相談推奨 (ひとりでやらない)
- ▶ 質問をする
  - ▶ 教員とティーチング・アシスタントは巡回
- ▶ 退室時, 小さな紙に感想など書いて提出する ←重要
  - ▶ 内容は何でも OK
  - ▶ 匿名で OK

# 目次

- ① 写像 (関数)
- ② 像と逆像
- ③ 写像の合成
- ④ 証明の例題
- ⑤ 今日のまとめ