

離散数理工学 第5回
離散代数：対称群と置換群

岡本 吉央
okamotoy@uec.ac.jp

電気通信大学

2018年11月15日

最終更新：2018年11月14日 14:27

スケジュール 後半 (予定)

- 8 離散確率論：確率的離散システムの解析 (12/13)
- ★ 中間試験 (12/20)
- 9 離散確率論：乱択データ構造とアルゴリズム (基礎) (1/10)
- 10 離散確率論：乱択データ構造とアルゴリズム (発展) (1/17)
- 11 離散確率論：マルコフ連鎖 (基礎) (1/24)
- 12 離散確率論：マルコフ連鎖 (発展) (1/31)
- 13 離散確率論：エントロピー (2/7)
- ★ 期末試験 (2/14?)

注意：予定の変更もありうる

Gál と Miltersen



<http://www.cs.utexas.edu/~panni/>

<https://resources.mpi-inf.mpg.de/conferences/adfocs-01/program.html>

この問題の出自 (データ構造に関する論文)

- ▶ Anna Gál, Peter Bro Miltersen: The cell probe complexity of succinct data structures. Theor. Comput. Sci. 379(3): 405–417 (2007)

100 囚人の問題：簡単な戦略

簡単な戦略

各死刑囚は、一様ランダムに 50 個の箱を明ける

この戦略で「全員釈放」となる確率は？

- ▶ 1 人の死刑囚が成功する確率は $\frac{50}{100} = \frac{1}{2}$
- ▶ ∴ 100 人全員が成功する確率は

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{100} \approx 7.89 \times 10^{-31}$$

これは「ほぼ 0」

スケジュール 前半 (予定)

- 1 数え上げの基礎：二項係数と二項定理 (10/4)
- ★ 休講 (10/11)
- 2 数え上げの基礎：漸化式の立て方 (10/18)
- 3 数え上げの基礎：漸化式の解き方 (基礎) (10/25)
- ★ 休講 (11/1)
- 4 数え上げの基礎：漸化式の解き方 (発展) (11/8)
- 5 離散代数：対称群と置換群 (11/15)
- ★ 休講 (11/22)
- 6 離散代数：有限群 (11/29)
- 7 離散代数：有限群の応用 (12/6)

注意：予定の変更もありうる

今日の目標

今日の目標

置換群に関する基礎的な用語が使えるようになる

- ▶ 置換, 二行記法, 巡回記法, 互換
- ▶ 偶置換, 奇置換
- ▶ 置換群, 対称群, 交代群
- ▶ 生成系

100 囚人の問題：設定

設定


- ▶ 100 人の死刑囚
 - ▶ 死刑囚には番号が振られている (1, 2, ..., 100)
 - ▶ 死刑囚は一人ずつ部屋に連れられて行き、そこで以下を行う
 - ▶ その部屋には 1, 2, ..., 100 と番号の書かれた箱がある
 - ▶ 箱には 1, 2, ..., 100 の中の番号が 1 つだけ書かれた紙が入っている
 - ▶ 紙に書かれている番号はすべて異なる
 - ▶ 死刑囚はその中の 50 個の箱を開けられる
 - ▶ 開けた箱の中に自分と同じ番号の紙が入っていれば「成功」
 - ▶ そうでなければ「失敗」
 - ▶ 全員の死刑囚が成功すれば、全員釈放。そうでなければ、全員死刑
- 死刑囚は前もって相談できる

問題

死刑囚はどれほどの確率で「全員釈放」されるか？

シミュレーション：単純な戦略

500 回の試行





- ① 置換
- ② 置換の巡回記法
- ③ Gál と Miltersen による 100 囚人の問題
- ④ 置換の符号
- ⑤ 置換群
- ⑥ 置換群の生成元
- ⑦ 今日のまとめ

復習：全単射

集合 A, B と写像 $f: A \rightarrow B$

全単射とは？

f が全単射であるとは、全射であり、かつ、単射であること





復習：単射

集合 A, B と写像 $f: A \rightarrow B$

単射とは？

f が単射であるとは、次を満たすこと

任意の $a, a' \in A$ に対して、 $f(a) = f(a')$ ならば $a = a'$



復習：写像の合成：例

- ▶ $A = \{1, 2, 3\}, B = \{4, 5, 6, 7\}, C = \{8, 9\}$
- ▶ 写像 $f: A \rightarrow B$ を次で定義
 - ▶ $f(1) = 5, f(2) = 4, f(3) = 7$
- ▶ 写像 $g: B \rightarrow C$ を次で定義
 - ▶ $g(4) = 8, g(5) = 9, g(6) = 9, g(7) = 8$


このとき、 $g \circ f: A \rightarrow C$ を考えると、

$$(g \circ f)(3) = g(f(3)) = g(7) = 8$$

有限集合 X

置換とは？

X 上の置換とは、 X から X への全単射のこと




復習：全射

集合 A, B と写像 $f: A \rightarrow B$

全射とは？

f が全射であるとは、次を満たすこと

任意の $b \in B$ に対して、ある $a \in A$ が存在して $b = f(a)$



全射ではない

全射である

復習：写像の合成

集合 A, B, C と写像 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$

写像の合成とは？

写像 f と g の合成を $g \circ f: A \rightarrow C$ と表記し、任意の $x \in A$ に対して

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$


とすることで定義する

注意： f の終域と g の始域が同じでないといけない
(同じでないときは合成を定義できない)

復習：写像の合成：例 (続)

- ▶ $A = \{1, 2, 3\}, B = \{4, 5, 6, 7\}, C = \{8, 9\}$
- ▶ 写像 $f: A \rightarrow B$ を次で定義
 - ▶ $f(1) = 5, f(2) = 4, f(3) = 7$
- ▶ 写像 $g: B \rightarrow C$ を次で定義
 - ▶ $g(4) = 8, g(5) = 9, g(6) = 9, g(7) = 8$

このとき、 $g \circ f: A \rightarrow C$ を考えると、




写像の合成の性質 (1)

集合 A, B, C, D と写像 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C, h: C \rightarrow D$

演習問題 (結合法則)

写像として, $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$




この性質より, $h \circ (g \circ f)$ や $(h \circ g) \circ f$ を $h \circ g \circ f$ と書くことが正当化される

写像の合成の性質 (2)

集合 A, B, C と写像 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$

演習問題 (全単射の合成も全単射)

f と g が全単射 $\Rightarrow g \circ f$ も全単射



復習: 恒等写像


集合 A と写像 $f: A \rightarrow A$

恒等写像とは?

f が **恒等写像** であるとは, 任意の $a \in A$ に対して $a = f(a)$ であること

- $A \rightarrow A$ の恒等写像を id_A と書くこともある
- 例: $A = \{1, 2, 3\}$ のとき $f: A \rightarrow A$ で

$$f(1) = 1, \quad f(2) = 2, \quad f(3) = 3$$




注: 恒等写像は置換である

復習: 逆写像

集合 A, B と写像 $f: A \rightarrow B$

逆写像とは?

f の **逆写像** とは, 写像 $g: B \rightarrow A$ で, $g \circ f = \text{id}_A$ かつ $f \circ g = \text{id}_B$ を満たすもの ($\text{id}_A: A \rightarrow A, \text{id}_B: B \rightarrow B$ は恒等写像)



この f の逆写像は存在する

記法

f の逆写像が存在するとき, それを f^{-1} で表す

復習: 逆写像の性質


集合 A, B , 写像 $f: A \rightarrow B$

逆写像が存在するための必要十分条件

写像 f の逆写像が存在する $\Leftrightarrow f$ が全単射

逆写像の性質

全単射 f の逆写像 f^{-1} も全単射



置換の性質 (ここまでのまとめ)

有限集合 X

ここまでのまとめ

- 恒等写像 id_X は X 上の置換
- π が X 上の置換 $\Rightarrow \pi^{-1}$ も X 上の置換
- π, ρ が X 上の置換 $\Rightarrow \pi \circ \rho$ も X 上の置換

置換の文脈では以下の用語・記法も使う


- id_X は X 上の **恒等置換** で, e と書くことがある
- 置換 π に対して, π^{-1} を π の **逆置換**
- 置換の合成を置換の **積** とも言う
- $\pi \circ \rho$ を $\pi\rho$ とも書く
- $\pi \circ \pi$ を π^2 とも書く (π^3, π^4 なども使う)
- $\pi^{-1} \circ \pi^{-1}$ を π^{-2} とも書く (π^{-3}, π^{-4} なども使う)
- 注: $(\pi^2)^{-1} = (\pi^{-1})^2$

写像の合成の性質 (3)

集合 A, B, C と **全単射** $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$

演習問題 (合成の逆写像は逆写像の合成)


写像として, $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$



置換を見て何を思うか?


置換を見て何を思うか? (1)

順列としての置換 (静的な見方)



置換を見て何を思うか? (2)

全単射としての置換 (動的な見方)



2つの見方を柔軟に使い分けられることができればよい


置換の二行記法

有限集合 $X = \{1, 2, \dots, n\}$

置換の二行記法

 X 上の置換 π を次のように書くことがある

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \pi(1) & \pi(2) & \cdots & \pi(n) \end{pmatrix}$$



$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

注意

- ▶ 二行記法で用いる括弧は必ず丸括弧
- ▶ $X = \{1, 2, \dots, n\}$ でなくても、同じ記法を用いることができる

二行記法に慣れる

 $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix}, \quad \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 1 & 6 & 2 & 5 \end{pmatrix}$ のとき,

$$\begin{aligned} \pi \circ \sigma &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 1 & 6 & 2 & 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 & 6 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 3 & 5 & 1 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 1 & 6 & 2 & 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 2 & 3 & 5 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \\ \pi^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & 4 & 6 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$


特殊な置換：隣接互換 (基本互換)

有限集合 $X = \{1, 2, \dots, n\}$

隣接互換とは？

 X 上の置換 π が隣接互換であるとは、ある i を用いて次のように書けること

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & i & i+1 & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & i+1 & i & \cdots & n \end{pmatrix}$$



$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$


特殊な置換：互換

有限集合 $X = \{1, 2, \dots, n\}$

互換とは？

 X 上の置換 π が互換であるとは、ある i, j を用いて次のように書けること

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & i & \cdots & j & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & j & \cdots & i & \cdots & n \end{pmatrix}$$



$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 6 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$



注意

- ▶ 隣接互換は互換である

目次

- 置換
- 置換の巡回記法
- Gál と Miltersen による 100 囚人の問題
- 置換の符号
- 置換群
- 置換群の生成元
- 今日のまとめ

置換の巡回記法：直感



$$\text{二行記法: } \pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{巡回記法: } \pi = (1\ 3\ 2)(5\ 6)$$


置換の巡回置換

有限集合 $X = \{1, 2, \dots, n\}$

巡回置換とは？

 X 上の置換 π が巡回置換であるとは、ある $x \in X$ と自然数 $k \geq 2$ が存在して、次が成り立つこと

- ▶ $x, \pi(x), \pi^2(x), \dots, \pi^{k-1}(x)$ がすべて異なり、
- ▶ $x = \pi^k(x)$ であり、
- ▶ 任意の $y \in X - \{x, \pi(x), \dots, \pi^{k-1}(x)\}$ に対して、 $y = \pi(y)$

巡回置換を $\pi = (x\ \pi(x)\ \pi^2(x)\ \cdots\ \pi^{k-1}(x))$ と表す (巡回記法)

$$\begin{aligned} \pi &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 5 & 6 \end{pmatrix} \\ &= (2\ 6\ 3\ 4) \end{aligned}$$

置換の巡回記法

巡回記法とは？

置換を互いに素な巡回置換の積 (合成) として表したものを

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix} = \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix} \right) \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix} \right)$$


$$\pi = (1\ 3\ 2)(5\ 6)$$

巡回記法に慣れる (1)

▶ 二行記法

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\ 6 & 5 & 3 & 11 & 4 & 7 & 1 & 10 & 15 & 12 & 14 & 8 & 13 & 2 & 9 \end{pmatrix}$$

▶ 巡回記法



巡回記法に慣れる (2)

$X = \{1, 2, 3, 4\}$ 上の置換をすべて考えてみる

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} = ()$ (or, e)	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} = (12)$
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} = (34)$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} = (12)(34)$
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix} = (23)$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} = (123)$
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} = (234)$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} = (1234)$
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix} = (243)$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} = (1243)$
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} = (24)$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} = (124)$

巡回記法に慣れる (3)

$X = \{1, 2, 3, 4\}$ 上の置換をすべて考えてみる

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = (132)$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = (1432)$
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix} = (1342)$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = (142)$
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} = (13)$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = (143)$
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = (234)$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = (14)$
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (13)(24)$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (1423)$
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (1324)$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (14)(23)$

目次

- ① 置換
- ② 置換の巡回記法
- ③ Gál と Miltersen による 100 囚人の問題
- ④ 置換の符号
- ⑤ 置換群
- ⑥ 置換群の生成元
- ⑦ 今日のまとめ

100 囚人の問題：設定

設定

- ▶ 100 人の死刑囚
 - ▶ 死刑囚には番号が振られている $(1, 2, \dots, 100)$
 - ▶ 死刑囚は一人ずつ部屋に連れられて行き、そこで以下を行う
 - ▶ その部屋には $1, 2, \dots, 100$ と番号の書かれた箱がある
 - ▶ 箱には $1, 2, \dots, 100$ の中の番号が 1 つだけ書かれた紙が入っている
 - ▶ 紙に書かれている番号はすべて異なる
 - ▶ 死刑囚はその中の 50 個の箱を開けられる
 - ▶ 開けた箱の中に自分と同じ番号の紙が入っていれば「成功」
 - ▶ そうでなければ「失敗」
 - ▶ 全員の死刑囚が成功すれば、全員釈放。そうでなければ、全員死刑
- 死刑囚は前もって相談できる

問題

死刑囚はどれほどの確率で「全員釈放」されるか？

100 囚人の問題：簡単な戦略

簡単な戦略

各死刑囚は、一様ランダムに 50 個の箱を明ける

この戦略で「全員釈放」となる確率は？


- ▶ 1 人の死刑囚が成功する確率は $\frac{50}{100} = \frac{1}{2}$
- ▶ \therefore 100 人全員が成功する確率は

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{100} \approx 7.89 \times 10^{-31}$$

これは「ほぼ 0」

シミュレーション：単純な戦略

500 回の試行



100 囚人の問題：賢い戦略

(Sven Skyum による)


賢い戦略

囚人 i は次の戦略を取る

- (1) まず、箱 i を開ける
- (2) いま開けた箱の紙に書いてあるのが i ならば、成功で終了
- (3) そうでなければ、その紙に書いてある番号の箱を開けて (2) に戻る

これだけ

500 回の試行



成功率 28.2%

ある囚人が失敗するのはいつか？

置換における互いに素な巡回置換に長さが 50 を超えるものがあるとき

長さが 50 を超える巡回置換は 1 つしかない (要素数が 100 だから)

- ▶ その巡回置換の長さを ℓ とする ($\ell > 50$)
- ▶ 要素数 100 の置換の中で、長さ ℓ の巡回置換を持つものの総数は

$$\binom{100}{\ell} (\ell - 1)! (100 - \ell)!$$

- ▶ 整理すると


$$\binom{100}{\ell} (\ell - 1)! (100 - \ell)! = \frac{100!}{\ell! (100 - \ell)!} (\ell - 1)! (100 - \ell)! = \frac{100!}{\ell}$$

500 回の試行



何が起きているのか？

500 回の試行




成功した囚人数が 50 の周りに分布していない

鍵となる考え

「箱 i 中にある紙の番号が $\pi(i)$ 」という置換 π を考える

置換の巡回表現



すべての囚人が成功するのはいつか？

置換における互いに素な巡回置換の長さがどれも 50 以下であるとき

そのような確率を求めるために、余事象を考えてみる

ある囚人が失敗するのはいつか？

置換における互いに素な巡回置換に長さが 50 を超えるものがあるとき

- ▶ したがって、失敗確率は


$$\frac{1}{100!} \sum_{\ell=51}^{100} \frac{100!}{\ell} = \sum_{\ell=51}^{100} \frac{1}{\ell} \approx 0.68$$

- ▶ したがって、成功確率は

$$1 - \sum_{\ell=51}^{100} \frac{1}{\ell} \approx 1 - 0.68 = 0.32$$

つまり、およそ 32 パーセントで成功する

500 回の試行



成功した囚人数が 50 の周りに分布 (50 = 成功した囚人数の期待値)

500 回の試行




賢い戦略は囚人ごとの「独立性」を壊している

- ① 置換
- ② 置換の巡回記法
- ③ Gál と Miltersen による 100 囚人の問題
- ④ 置換の符号
- ⑤ 置換群
- ⑥ 置換群の生成元
- ⑦ 今日のまとめ

置換を互換の積として表してみる : Part 2

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 3)(3\ 4)$$



偶置換と奇置換

性質：互換の数の偶奇性 (再掲)

任意の有限集合 X 上の任意の置換 π に対して、 π を互換の積として表したとき、現れる互換の数の偶奇性は必ず等しい

この性質をもとにして、次の用語を定義する

偶置換, 奇置換とは?

偶置換とは、偶数個の互換の積として表せる置換のこと
奇置換とは、奇数個の互換の積として表せる置換のこと


例:

- ▶ 恒等置換 e は偶置換
- ▶ 巡回置換 $(1\ 2\ 3\ 4)$ は奇置換 $((1\ 2\ 3\ 4) = (1\ 2)(2\ 3)(3\ 4))$

- ① 置換
- ② 置換の巡回記法
- ③ Gál と Miltersen による 100 囚人の問題
- ④ 置換の符号
- ⑤ 置換群
- ⑥ 置換群の生成元
- ⑦ 今日のまとめ

置換を互換の積として表してみる

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 2)(2\ 3)(1\ 2)(3\ 4)$$



置換を互換の積として表してみる : 互換の数の偶奇性

ここまでのまとめ

- ▶ 任意の置換は、いくつかの互換の積 (合成) として表せる
- ▶ その表し方は、一通りではない

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 2)(2\ 3)(1\ 2)(3\ 4) = (1\ 3)(3\ 4)$$


しかし、次が (一般的に) 言える

性質：互換の数の偶奇性

任意の有限集合 X 上の任意の置換 π に対して、 π を互換の積として表したとき、現れる互換の数の偶奇性は必ず等しい

偶置換か奇置換か、簡単に判別するには?

「交点の数」の偶奇性を調べればよい



置換群とは?

有限集合 X

置換群とは?

X 上の置換群とは、 X 上の置換の集合 S で以下を満たすもの

- 1 $e \in S$ (恒等置換を持つ)
- 2 $\pi, \sigma \in S$ ならば $\pi\sigma \in S$ (積で閉じている)
- 3 $\pi \in S$ ならば $\pi^{-1} \in S$ (逆置換も持つ)

有限集合 X

対称群とは？

 X 上の対称群とは、 X 上の置換をすべて集めた集合

- ▶ $S(X), \mathcal{S}(X), \mathfrak{S}(X)$ と書くことが多い
- ▶ $|X| = n$ のときは、 n 次の対称群 (n 次対称群) と呼ばれ、 $S_n, \mathcal{S}_n, \mathfrak{S}_n$ と書くことが多い

例 : $X = \{1, 2, 3\}$ のとき

$$S_3 = \{e, (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$$


注 : $|S_n| = n!$

目次

- 置換
- 置換の巡回記法
- Gál と Miltersen による 100 囚人の問題
- 置換の符号
- 置換群
- 置換群の生成元
- 今日のまとめ

対称群の生成 (2)


ケーリー・グラフ (定義は後ほど)

 π_2, π_3 は対称群 S_3 を生成する

置換群を生成する (2)

例題 2

$X = \{1, 2, 3\}$ 上の置換群で、 $\pi_1 = (1\ 2)$ と $\pi_2 = (2\ 3)$ が生成するものを G とすると、 G は何？

よって、 $G = \{e, (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\} = S_3$ 有限集合 X

交代群とは？

 X 上の交代群とは、 X 上の偶置換をすべて集めた集合

- ▶ $A(X), \mathcal{A}(X), \mathfrak{A}(X)$ と書くことが多い
- ▶ $|X| = n$ のときは、 n 次の交代群 (n 次交代群) と呼ばれ、 $A_n, \mathcal{A}_n, \mathfrak{A}_n$ と書くことが多い


例 : $X = \{1, 2, 3\}$ のとき

$$A_3 = \{e, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$$

注 : $|A_n| = n!/2$

対称群の生成 (1)

ケーリー・グラフ (定義は後ほど)



$$\pi_3 \pi_6 \pi_2 = \pi_6$$

置換群を生成する (1)

例題 1

$X = \{1, 2, 3\}$ 上の置換群で、 $\pi = (1\ 2\ 3)$ が生成するものを G とすると、 G は何？

よって、 $G = \{e, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$

置換群の生成系

有限集合 $X = \{1, 2, \dots, n\}$

置換の集合が生成する置換群とは？

X 上の置換の集合 S に対して、 S が生成する X 上の置換群とは、 X 上の置換群で、 S を含むような最小のもの $\langle S \rangle$ と書く

先ほどの例 : $X = \{1, 2, 3\}$ のとき

- ▶ $\langle \{(1\ 2\ 3)\} \rangle = \{e, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$
- ▶ $\langle \{(1\ 2), (2\ 3)\} \rangle = \{e, (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$

注 : $\langle \{(1\ 2), (2\ 3)\} \rangle$ と書かず、 $\langle (1\ 2), (2\ 3) \rangle$ と書くことも多い

用語


置換群 G に対して、 $G = \langle S \rangle$ であるとき、 S を G の生成系と呼ぶ (ことがある)

置換群 G とその生成系 S

ケーリー・グラフとは？

(G, S) のケーリー・グラフとは、次で定義される有向グラフ

- ▶ 頂点集合は G
- ▶ 弧 $(\pi, \pi') \in G \times G$ がある \Leftrightarrow ある $\sigma \in S$ が存在して、 $\pi' = \pi\sigma$



- 1 置換
- 2 置換の巡回記法
- 3 Gál と Miltersen による 100 囚人の問題
- 4 置換の符号
- 5 置換群
- 6 置換群の生成元
- 7 今日のまとめ

今日の目標

今日の目標

置換群に関する基礎的な用語が使えるようになる

- ▶ 置換, 二行記法, 巡回記法, 互換
- ▶ 偶置換, 奇置換
- ▶ 置換群, 対称群, 交代群
- ▶ 生成系

残った時間の使い方

- ▶ 演習問題をやる
 - ▶ 相談推奨 (ひとりでやらない)
- ▶ 質問をする
 - ▶ 教員と TA は巡回
- ▶ 退室時, 小さな紙に感想など書いて提出する ← 重要
 - ▶ 内容は何でも OK
 - ▶ 匿名で OK