

離散数理工学 第 1 回

二項係数と二項定理

岡本 吉央

okamotoy@uec.ac.jp

電気通信大学

2021 年 10 月 12 日

最終更新 : 2021 年 10 月 3 日 19:35

今日の目標

二項係数について さらに詳しく

- ▶ 二項係数：上界と下界
- ▶ 二項定理
- ▶ カタラン数

目次

- ① 階乗：上界と下界
- ② 二項係数：上界と下界
- ③ 二項定理
- ④ カタラン数
- ⑤ 今日のまとめ

階乗：再帰的定義 — 復習

定義：階乗とは？（再帰的定義）

自然数 $n \geq 0$ の **階乗** とは、次で定義される自然数のこと

$$n! = \begin{cases} 1 & (n = 0 \text{ のとき}) \\ n \cdot (n - 1)! & (n \geq 1 \text{ のとき}) \end{cases}$$

例：

- ▶ $0! = 1$
- ▶ $1! = 1 \cdot 0! = 1 \cdot 1 = 1$
- ▶ $2! = 2 \cdot 1! = 2 \cdot 1 = 2$
- ▶ $3! = 3 \cdot 2! = 3 \cdot 2 = 6$
- ▶ $4! = 4 \cdot 3! = 4 \cdot 6 = 24$
- ▶ ...


階乗：漸近公式

階乗の性質：スターリングの公式

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right)$$

特に,

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$



← $\frac{n!}{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n}$ のプロット

証明は『複素関数論』の
典型的な応用であるが、
ここでは行わない

階乗：上界と下界 (かかい)

実用上、次のような「荒い評価」で十分なことも多い

階乗の性質：簡単な評価

任意の自然数 $n \geq 1$ に対して

$$e \left(\frac{n}{e}\right)^n \leq n! \leq en \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

つまり、

- ▶ $en \left(\frac{n}{e}\right)^n$ は $n!$ の上界
- ▶ $e \left(\frac{n}{e}\right)^n$ は $n!$ の下界 (かかい)

格言

漸近公式は難しい。簡単な上界・下界を使いこなす。

階乗：上界と下界 — 上界の証明

実用上、次のような「荒い評価」で十分なことも多い

階乗の性質：簡単な評価

任意の自然数 $n \geq 1$ に対して

$$e \left(\frac{n}{e}\right)^n \leq n! \leq en \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

上界の証明： n に関する帰納法
[基底段階] $n = 1$ のとき

(下界は演習問題)

階乗：上界と下界 — 上界の証明

実用上、次のような「荒い評価」で十分なことも多い

階乗の性質：簡単な評価

任意の自然数 $n \geq 1$ に対して

$$e \left(\frac{n}{e}\right)^n \leq n! \leq e n \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

上界の証明： n に関する帰納法

(下界は演習問題)

[基底段階] $n = 1$ のとき

▶ $n! = 1! = 1$

階乗：上界と下界 — 上界の証明

実用上、次のような「荒い評価」で十分なことも多い

階乗の性質：簡単な評価

任意の自然数 $n \geq 1$ に対して

$$e \left(\frac{n}{e}\right)^n \leq n! \leq e n \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

上界の証明： n に関する帰納法

(下界は演習問題)

[基底段階] $n = 1$ のとき

- ▶ $n! = 1! = 1$
- ▶ $e n \left(\frac{n}{e}\right)^n = e \cdot 1 \left(\frac{1}{e}\right)^1 = 1$

階乗：上界と下界 — 上界の証明

実用上、次のような「荒い評価」で十分なことも多い

階乗の性質：簡単な評価

任意の自然数 $n \geq 1$ に対して

$$e \left(\frac{n}{e}\right)^n \leq n! \leq e n \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

上界の証明： n に関する帰納法

(下界は演習問題)

[基底段階] $n = 1$ のとき

- ▶ $n! = 1! = 1$
- ▶ $e n \left(\frac{n}{e}\right)^n = e \cdot 1 \left(\frac{1}{e}\right)^1 = 1$
- ▶ したがって、 $n! \leq e n \left(\frac{n}{e}\right)^n$ となる

階乗：上界と下界 — 上界の証明 (続き)

階乗の性質：簡単な評価

任意の自然数 $n \geq 1$ に対して

$$e \left(\frac{n}{e}\right)^n \leq n! \leq e n \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

上界の証明： n に関する帰納法[帰納段階] 任意の自然数 $k \geq 1$ を考える

▶ $k! \leq e k \left(\frac{k}{e}\right)^k$ となると仮定

階乗：上界と下界 — 上界の証明 (続き)

階乗の性質：簡単な評価

任意の自然数 $n \geq 1$ に対して

$$e \left(\frac{n}{e}\right)^n \leq n! \leq en \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

上界の証明： n に関する帰納法[帰納段階] 任意の自然数 $k \geq 1$ を考える

▶ $k! \leq ek \left(\frac{k}{e}\right)^k$ となると仮定

証明すること (目標)

$$(k+1)! \leq e(k+1) \left(\frac{k+1}{e}\right)^{k+1}$$


有用な不等式

事実：有用な不等式

(演習問題)

任意の実数 x に対して

$$1 + x \leq e^x$$



階乗：上界と下界 — 上界の証明 (続き 2)

$$(k + 1)! = (k + 1) \cdot k!$$

階乗：上界と下界 — 上界の証明 (続き 2)

$$\begin{aligned}(k+1)! &= (k+1) \cdot k! \\ &\leq (k+1) \cdot e k \left(\frac{k}{e}\right)^k \quad (\text{帰納法の仮定})\end{aligned}$$

階乗：上界と下界 — 上界の証明 (続き 2)

$$\begin{aligned}(k+1)! &= (k+1) \cdot k! \\ &\leq (k+1) \cdot e k \left(\frac{k}{e}\right)^k \quad (\text{帰納法の仮定}) \\ &= e \left(\frac{k}{k+1}\right)^{k+1} \cdot e(k+1) \left(\frac{k+1}{e}\right)^{k+1}\end{aligned}$$

階乗：上界と下界 — 上界の証明 (続き 2)

$$\begin{aligned}(k+1)! &= (k+1) \cdot k! \\ &\leq (k+1) \cdot e k \left(\frac{k}{e}\right)^k \quad (\text{帰納法の仮定}) \\ &= e \left(\frac{k}{k+1}\right)^{k+1} \cdot e(k+1) \left(\frac{k+1}{e}\right)^{k+1} \\ &= e \left(\frac{(k+1)-1}{k+1}\right)^{k+1} \cdot e(k+1) \left(\frac{k+1}{e}\right)^{k+1}\end{aligned}$$

階乗：上界と下界 — 上界の証明 (続き 2)

$$\begin{aligned}(k+1)! &= (k+1) \cdot k! \\ &\leq (k+1) \cdot e k \left(\frac{k}{e}\right)^k \quad (\text{帰納法の仮定}) \\ &= e \left(\frac{k}{k+1}\right)^{k+1} \cdot e(k+1) \left(\frac{k+1}{e}\right)^{k+1} \\ &= e \left(\frac{(k+1)-1}{k+1}\right)^{k+1} \cdot e(k+1) \left(\frac{k+1}{e}\right)^{k+1} \\ &= e \left(1 - \frac{1}{k+1}\right)^{k+1} \cdot e(k+1) \left(\frac{k+1}{e}\right)^{k+1}\end{aligned}$$

階乗：上界と下界 — 上界の証明 (続き 2)

$$\begin{aligned}
(k+1)! &= (k+1) \cdot k! \\
&\leq (k+1) \cdot e k \left(\frac{k}{e}\right)^k && \text{(帰納法の仮定)} \\
&= e \left(\frac{k}{k+1}\right)^{k+1} \cdot e(k+1) \left(\frac{k+1}{e}\right)^{k+1} \\
&= e \left(\frac{(k+1)-1}{k+1}\right)^{k+1} \cdot e(k+1) \left(\frac{k+1}{e}\right)^{k+1} \\
&= e \left(1 - \frac{1}{k+1}\right)^{k+1} \cdot e(k+1) \left(\frac{k+1}{e}\right)^{k+1} \\
&\leq e \left(e^{-\frac{1}{k+1}}\right)^{k+1} \cdot e(k+1) \left(\frac{k+1}{e}\right)^{k+1}
\end{aligned}$$

階乗：上界と下界 — 上界の証明 (続き 2)

$$\begin{aligned}
(k+1)! &= (k+1) \cdot k! \\
&\leq (k+1) \cdot e k \left(\frac{k}{e}\right)^k && \text{(帰納法の仮定)} \\
&= e \left(\frac{k}{k+1}\right)^{k+1} \cdot e(k+1) \left(\frac{k+1}{e}\right)^{k+1} \\
&= e \left(\frac{(k+1)-1}{k+1}\right)^{k+1} \cdot e(k+1) \left(\frac{k+1}{e}\right)^{k+1} \\
&= e \left(1 - \frac{1}{k+1}\right)^{k+1} \cdot e(k+1) \left(\frac{k+1}{e}\right)^{k+1} \\
&\leq e \left(e^{-\frac{1}{k+1}}\right)^{k+1} \cdot e(k+1) \left(\frac{k+1}{e}\right)^{k+1} \\
&= e \cdot (e^{-1}) \cdot e(k+1) \left(\frac{k+1}{e}\right)^{k+1}
\end{aligned}$$

階乗：上界と下界 — 上界の証明 (続き 2)

$$\begin{aligned}
(k+1)! &= (k+1) \cdot k! \\
&\leq (k+1) \cdot e k \left(\frac{k}{e}\right)^k && \text{(帰納法の仮定)} \\
&= e \left(\frac{k}{k+1}\right)^{k+1} \cdot e(k+1) \left(\frac{k+1}{e}\right)^{k+1} \\
&= e \left(\frac{(k+1)-1}{k+1}\right)^{k+1} \cdot e(k+1) \left(\frac{k+1}{e}\right)^{k+1} \\
&= e \left(1 - \frac{1}{k+1}\right)^{k+1} \cdot e(k+1) \left(\frac{k+1}{e}\right)^{k+1} \\
&\leq e \left(e^{-\frac{1}{k+1}}\right)^{k+1} \cdot e(k+1) \left(\frac{k+1}{e}\right)^{k+1} \\
&= e \cdot (e^{-1}) \cdot e(k+1) \left(\frac{k+1}{e}\right)^{k+1} = e(k+1) \left(\frac{k+1}{e}\right)^{k+1} \quad \square
\end{aligned}$$

目次

- ① 階乗：上界と下界
- ② 二項係数：上界と下界
- ③ 二項定理
- ④ カタラン数
- ⑤ 今日のまとめ

二項係数 — 復習

定義： **二項係数** とは？

自然数 a, b で $a \geq b$ を満たすものに対して,

$$\binom{a}{b} = \frac{a!}{b!(a-b)!}$$

- ▶ $\binom{a}{b}$ は「 a choose b 」と読む (のが普通)
- ▶ 「 ${}_aC_b$ 」という記号を高校では (なぜか) 使うが、国際的にはあまり用いられない (通じないか, 通じにくい)

二項係数：上界と下界

二項係数の性質：簡単な評価

任意の自然数 $a \geq 1$ と任意の自然数 $b \geq 1$ に対して、 $a \geq b$ であるとき、

$$\left(\frac{a}{b}\right)^b \leq \binom{a}{b} \leq \left(\frac{ea}{b}\right)^b$$

上界の証明：演習問題

- ▶ ヒント：まず、 $\binom{a}{b} \leq \frac{a^b}{b!}$ を証明する
- ▶ ヒント：階乗に対する下界を使う

二項係数：上界と下界 (下界の証明 (1))

二項係数の性質：簡単な評価

任意の自然数 $a \geq 1$ と任意の自然数 $b \geq 1$ に対して、 $a \geq b$ であるとき、

$$\left(\frac{a}{b}\right)^b \leq \binom{a}{b} \leq \left(\frac{ea}{b}\right)^b$$

下界の証明： b に関する帰納法

- ▶ この場合の帰納法の進め方
 - ▶ [基底段階] $b = 1$ の場合を証明する
 - ▶ [帰納段階] 任意の自然数 $k \geq 1$ に対して、
 $b = k$ の場合に正しいと仮定して、
 $b = k + 1$ の場合を証明する

二項係数：上界と下界 (下界の証明 (2))

[基底段階] $b = 1$ とする. 任意の $a \geq b$ を考えると

- ▶ 左辺 = $\binom{a}{1} = a$
- ▶ 右辺 = $\binom{a}{1} = a$
- ▶ \therefore 左辺 = 右辺

[帰納段階] 任意の自然数 $k \geq 1$ を考える

- ▶ $b = k$ の場合に正しいと仮定する
すなわち, 任意の $a \geq b = k$ に対して

$$\binom{a}{k} \leq \binom{a}{k}$$

- ▶ 証明することは, $b = k + 1$ の場合に正しいことである
すなわち, 任意の $a \geq b = k + 1$ に対して

$$\binom{a}{k+1} \leq \binom{a}{k+1}$$

二項係数：上界と下界 (下界の証明 (3))

[帰納段階 (続き)]

$$\binom{a}{k+1} = \frac{a}{k+1} \binom{a-1}{k} \quad (\text{吸収恒等式})$$



二項係数：上界と下界 (下界の証明 (3))

[帰納段階 (続き)]

$$\begin{aligned} \binom{a}{k+1} &= \frac{a}{k+1} \binom{a-1}{k} && \text{(吸収恒等式)} \\ &\geq \frac{a}{k+1} \left(\frac{a-1}{k}\right)^k && \text{(帰納法の仮定)} \end{aligned}$$



二項係数：上界と下界 (下界の証明 (3))

[帰納段階 (続き)]

$$\binom{a}{k+1} = \frac{a}{k+1} \binom{a-1}{k} \quad (\text{吸収恒等式})$$

$$\geq \frac{a}{k+1} \left(\frac{a-1}{k}\right)^k \quad (\text{帰納法の仮定})$$

$$\geq \frac{a}{k+1} \left(\frac{a}{k+1}\right)^k$$



二項係数：上界と下界 (下界の証明 (3))

[帰納段階 (続き)]

$$\begin{aligned}
 \binom{a}{k+1} &= \frac{a}{k+1} \binom{a-1}{k} && \text{(吸収恒等式)} \\
 &\geq \frac{a}{k+1} \left(\frac{a-1}{k}\right)^k && \text{(帰納法の仮定)} \\
 &\geq \frac{a}{k+1} \left(\frac{a}{k+1}\right)^k \\
 &= \left(\frac{a}{k+1}\right)^{k+1}
 \end{aligned}$$

□

注 : $a \geq k+1$ のとき, $(a-1)(k+1) \geq ak$

二項係数：上界と下界 (下界の証明 (3))

[帰納段階 (続き)]

$$\begin{aligned}
 \binom{a}{k+1} &= \frac{a}{k+1} \binom{a-1}{k} && \text{(吸収恒等式)} \\
 &\geq \frac{a}{k+1} \left(\frac{a-1}{k}\right)^k && \text{(帰納法の仮定)} \\
 &\geq \frac{a}{k+1} \left(\frac{a}{k+1}\right)^k \\
 &= \left(\frac{a}{k+1}\right)^{k+1} = \left(\frac{a}{b}\right)^b
 \end{aligned}$$

□

注 : $a \geq k+1$ のとき, $(a-1)(k+1) \geq ak$

目次

- ① 階乗：上界と下界
- ② 二項係数：上界と下界
- ③ 二項定理
- ④ カタラン数
- ⑤ 今日のまとめ

二項定理

性質：二項定理

任意の複素数 x, y と任意の自然数 $n \geq 0$ に対して,

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

証明：演習問題

- ▶ ヒント： n に関する数学的帰納法 + パスカルの規則

二項定理の応用 (1)

例題 1

任意の自然数 $n \geq 0$ に対して

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

証明 : 二項定理の式において, $x = y = 1$ とすると

$$2^n = (1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \quad \square$$


例題 1 : 組合せ的解釈 (着色)

例題 1

任意の自然数 $n \geq 0$ に対して

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

- ▶ 右辺 = n 個のものの中からいくつかに色を塗る方法の総数
- ▶ 左辺の第 k 項 = n 個のものの中から k 個に色を塗る方法の総数




例題 1 : 組合せ的解釈 (着色)

例題 1

任意の自然数 $n \geq 0$ に対して

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

- ▶ 右辺 = n 個のものの中からいくつかに色を塗る方法の総数
- ▶ 左辺の第 k 項 = n 個のものの中から k 個に色を塗る方法の総数



二項定理の応用 (2)

例題 2

任意の自然数 $n \geq 1$ に対して

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

二項定理の応用 (2)

例題 2

任意の自然数 $n \geq 1$ に対して

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

証明 : 二項定理の式において, $x = -1, y = 1$ とすると

$$0 = (-1 + 1)^n$$

二項定理の応用 (2)

例題 2

任意の自然数 $n \geq 1$ に対して

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

証明 : 二項定理の式において, $x = -1, y = 1$ とすると

$$0 = (-1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k 1^{n-k}$$

二項定理の応用 (2)

例題 2

任意の自然数 $n \geq 1$ に対して

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

証明 : 二項定理の式において, $x = -1, y = 1$ とすると

$$0 = (-1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k \quad \square$$

二項定理の応用 (3)

例題 3

任意の自然数 $n \geq 0$ に対して

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$

二項定理の応用 (3)

例題 3

任意の自然数 $n \geq 0$ に対して

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$

証明 : 二項定理より

$$(x + 1)^{2n}$$

二項定理の応用 (3)

例題 3

任意の自然数 $n \geq 0$ に対して

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$

証明 : 二項定理より

$$(x + 1)^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} x^k 1^{2n-k}$$

二項定理の応用 (3)

例題 3

任意の自然数 $n \geq 0$ に対して

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$

証明 : 二項定理より

$$(x+1)^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} x^k 1^{2n-k} = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} x^k$$

二項定理の応用 (3)

例題 3

任意の自然数 $n \geq 0$ に対して

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$

証明 : 二項定理より

$$(x+1)^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} x^k 1^{2n-k} = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} x^k$$

特に, $(x+1)^{2n}$ における x^n の係数は $\binom{2n}{n}$

二項定理の応用 (3) : 証明の続き

一方,

$$(x + 1)^{2n} = (x + 1)^n (x + 1)^n$$

二項定理の応用 (3) : 証明の続き

一方,

$$(x + 1)^{2n} = (x + 1)^n (x + 1)^n = \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k \right) \left(\sum_{\ell=0}^n \binom{n}{\ell} x^\ell \right)$$

二項定理の応用 (3) : 証明の続き

一方,

$$\begin{aligned}(x+1)^{2n} &= (x+1)^n(x+1)^n = \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k \right) \left(\sum_{\ell=0}^n \binom{n}{\ell} x^\ell \right) \\ &= \sum_{k=0}^n \sum_{\ell=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{\ell} x^{k+\ell}\end{aligned}$$

二項定理の応用 (3) : 証明の続き

一方,

$$\begin{aligned}(x+1)^{2n} &= (x+1)^n(x+1)^n = \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k \right) \left(\sum_{\ell=0}^n \binom{n}{\ell} x^\ell \right) \\ &= \sum_{k=0}^n \sum_{\ell=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{\ell} x^{k+\ell}\end{aligned}$$

つまり, この式における x^n の係数は

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k}$$

二項定理の応用 (3) : 証明の続き

一方,

$$\begin{aligned}(x+1)^{2n} &= (x+1)^n(x+1)^n = \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k \right) \left(\sum_{\ell=0}^n \binom{n}{\ell} x^\ell \right) \\ &= \sum_{k=0}^n \sum_{\ell=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{\ell} x^{k+\ell}\end{aligned}$$

つまり, この式における x^n の係数は

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{k}$$

二項定理の応用 (3) : 証明の続き

一方,

$$\begin{aligned}(x+1)^{2n} &= (x+1)^n(x+1)^n = \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k \right) \left(\sum_{\ell=0}^n \binom{n}{\ell} x^\ell \right) \\ &= \sum_{k=0}^n \sum_{\ell=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{\ell} x^{k+\ell}\end{aligned}$$

つまり, この式における x^n の係数は

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$$

二項定理の応用 (3) : 証明の続き

一方,

$$\begin{aligned} (x+1)^{2n} &= (x+1)^n (x+1)^n = \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k \right) \left(\sum_{\ell=0}^n \binom{n}{\ell} x^\ell \right) \\ &= \sum_{k=0}^n \sum_{\ell=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{\ell} x^{k+\ell} \end{aligned}$$

つまり, この式における x^n の係数は

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$$

したがって,

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$


□

例題 3 : 組合せ的解釈 (格子道)

例題 3

任意の自然数 $n \geq 0$ に対して

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$

右辺 = $(0,0)$ から (n,n) へ至る格子道の総数


例題 3 : 組合せ的解釈 (格子道)

例題 3

任意の自然数 $n \geq 0$ に対して

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$

左辺の第 k 項 = $(0,0)$ から (n,n) へ至る格子道の中で,
 $(k, n-k)$ を通るものの総数




例題 3 : 組合せ的解釈 (格子道)

例題 3

任意の自然数 $n \geq 0$ に対して

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$

左辺の第 k 項 = $(0, 0)$ から (n, n) へ至る格子道の中で,
 $(k, n - k)$ を通るものの総数



目次

- ① 階乗：上界と下界
- ② 二項係数：上界と下界
- ③ 二項定理
- ④ カタラン数
- ⑤ 今日のまとめ

カタラン数

定義：カタラン数とは？

自然数 $n \geq 0$ に対して、**第 n カタラン数** C_n とは、

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

- ▶ $C_0 = \frac{1}{0+1} \binom{2 \cdot 0}{0} = \frac{1}{1} \binom{0}{0} = 1 \cdot 1 = 1$
- ▶ $C_1 = \frac{1}{1+1} \binom{2 \cdot 1}{1} = \frac{1}{2} \binom{2}{1} = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$
- ▶ $C_2 = \frac{1}{2+1} \binom{2 \cdot 2}{2} = \frac{1}{3} \binom{4}{2} = \frac{1}{3} \cdot 6 = 2$
- ▶ $C_3 = \frac{1}{3+1} \binom{2 \cdot 3}{3} = \frac{1}{4} \binom{6}{3} = \frac{1}{4} \cdot 20 = 5$
- ▶ $C_4 = \frac{1}{4+1} \binom{2 \cdot 4}{4} = \frac{1}{5} \binom{8}{4} = \frac{1}{5} \cdot 70 = 14$
- ▶ $C_5 = \frac{1}{5+1} \binom{2 \cdot 5}{5} = \frac{1}{6} \binom{10}{5} = \frac{1}{6} \cdot 252 = 42$

Eugène C. Catalan



カタラン
(1814–1894)

<http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Catalan.html>

カタラン数の上界と下界

第 n カタラン数の定義任意の $n \geq 0$ に対して

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

二項係数：簡単な評価（復習）

任意の自然数 $a \geq 1$ と任意の自然数 $b \geq 1$ に対して, $a \geq b$ であるとき,

$$\left(\frac{a}{b}\right)^b \leq \binom{a}{b} \leq \left(\frac{ea}{b}\right)^b$$

したがって, カタラン数に対する以下の上界と下界が得られる

$$\frac{2^n}{n+1} \leq C_n \leq \frac{(2e)^n}{n+1}$$

∴ カタラン数は n に関して指数関数的に増加する

カタラン数の組合せ的解釈



リチャード・スタンレイ

- ▶ MIT 数学科の名誉教授
- ▶ 組合せ論の研究者 (大家)
- ▶ カタラン数の組合せ的解釈を
214 個収集した

ここでは 3 つだけ紹介

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_P._Stanley

カタラン数の組合せ的解釈 (1) : 入れ子状の括弧列

自然数 $n \geq 1$

性質 : カタラン数と入れ子状の括弧列

 $C_n = 2n$ 個の括弧の列で, 入れ子状になっているもの

入れ子状 = 左右の対応が取れている


()	() ()	() () ()	() () ()	() (())	(()) ()	(() ())	(() ()) ()
-----	---------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

() () () ()	() (()) ()	() () (())	() ((()))	() (() ())	(()) () ()	(()) (())
((())) ()	(() ()) ()	(() () ())	((())) ()	(() (()))	((() ()))	(((())))

カタラン数の組合せ的解釈 (2) : 全二分木の総数

自然数 $n \geq 1$

性質 : カタラン数と全二分木

 $C_n =$ 葉の数が $n + 1$ である順序付きラベルなし全二分木の総数

全二分木 = 葉以外の頂点には子がちょうど2つ


順序付き = 左右を区別する, ラベルなし = 頂点・辺にラベル (名) がない

カタラン数の組合せ的解釈 (3) : ディック道

定義 : ディック道 (Dyck path) とは ?

ディック道 とは, $(0,0)$ から (n,n) へ至る格子道で,
直線 $y = x$ の下側を通らないもの

$C_n = (0,0)$ から (n,n) へ至るディック道の総数



なぜカタラン数がこれらを数えるのか？

カタラン数が数えるもの

- ▶ 入れ子状の括弧列
- ▶ 全二分木 (順序付きラベルなし)
- ▶ ディック道
- ▶ ...

疑問






カタラン数は なぜ これらを数えるのか？

解答は、後の講義で (あるいは演習問題で)

今から行うこと


これらが同じ数列で数えられることの証明

⇒ **全単射による証明** (一対一対応による証明)

入れ子状の括弧列 \leftrightarrow 順序付きラベルなし全二分木 $(()) ()$ $((()))$ $(() ())$ $() (())$ $() () ()$ 

- ▶ 括弧列の「(」 \leftrightarrow 二分木で、左に降りる辺
- ▶ 括弧列の「)」 \leftrightarrow 二分木で、右の降りる辺

「左優先」の深さ優先探索で辺を訪問する順に従って、括弧列が得られる

入れ子状の括弧列 \leftrightarrow 順序付きラベルなし全二分木 $(()) ()$ $((()))$ $(() ())$ $() (())$ $() () ()$ 

- ▶ 括弧列の「(」 \leftrightarrow 二分木で、左に降りる辺
- ▶ 括弧列の「)」 \leftrightarrow 二分木で、右の降りる辺

「左優先」の深さ優先探索で辺を訪問する順に従って、括弧列が得られる

入れ子状の括弧列 \leftrightarrow ディック道

$(()) ()$ $((()))$ $(() ())$ $() (())$ $() () ()$





- ▶ 括弧列の「(」 \leftrightarrow ディック道で, 上に進む
- ▶ 括弧列の「)」 \leftrightarrow ディック道で, 右に進む

入れ子状の括弧列 \leftrightarrow ディック道

$(()) ()$ $((()))$ $(() ())$ $() (())$ $() () ()$
 $\uparrow\uparrow\rightarrow\rightarrow\uparrow\rightarrow$ $\uparrow\uparrow\uparrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow$ $\uparrow\uparrow\rightarrow\uparrow\rightarrow\rightarrow$ $\uparrow\rightarrow\uparrow\uparrow\rightarrow\rightarrow$ $\uparrow\rightarrow\uparrow\rightarrow\uparrow\rightarrow$




- ▶ 括弧列の「(」 \leftrightarrow ディック道で, 上に進む
- ▶ 括弧列の「)」 \leftrightarrow ディック道で, 右に進む

全二分木 \leftrightarrow ディック道



- ▶ 二分木で、左に降りる辺 \leftrightarrow ディック道で、上に進む
- ▶ 二分木で、右の降りる辺 \leftrightarrow ディック道で、右に進む

「左優先」の深さ優先探索で辺を訪問する順に従って、進み方が得られる

全二分木 \leftrightarrow ディック道

- ▶ 二分木で、左に降りる辺 \leftrightarrow ディック道で、上に進む
- ▶ 二分木で、右の降りる辺 \leftrightarrow ディック道で、右に進む

「左優先」の深さ優先探索で辺を訪問する順に従って、進み方が得られる

全二分木 \leftrightarrow ディック道

- ▶ 二分木で、左に降りる辺 \leftrightarrow ディック道で、上に進む
- ▶ 二分木で、右の降りる辺 \leftrightarrow ディック道で、右に進む

「左優先」の深さ優先探索で辺を訪問する順に従って、進み方が得られる

目次

- ① 階乗：上界と下界
- ② 二項係数：上界と下界
- ③ 二項定理
- ④ カタラン数
- ⑤ 今日のまとめ

次回の予告

今日のまとめ

二項係数について さらに詳しく

- ▶ 二項係数：上界と下界
- ▶ 二項定理
- ▶ カタラン数

格言

漸近公式は難しい。簡単な上界・下界を使いこなす。

次回の予告

漸化式を立てられるようになる

- ▶ 組合せ構造の数え上げ
- ▶ アルゴリズムの計算量