

# 離散最適化基礎論 第 1 回

グラフの彩色と準同型

岡本 吉央

okamotoy@uec.ac.jp

電気通信大学

2021 年 10 月 5 日

最終更新 : 2021 年 10 月 13 日 13:40

## 主題

離散最適化のトピックの1つとして **グラフの準同型** を取り上げ、その**数理的側面**と**計算的側面**の双方を意識して講義する

## なぜ講義で取り扱う？

- ▶ それ自体が重要なトピックであるから
- ▶ 離散数学の重要な概念が多く登場するから
  - ▶ グラフ, 写像
  - ▶ 同値関係, 順序関係
  - ▶ アルゴリズム, 計算量

## この講義の目的

**グラフの準同型** を通して, **グラフの彩色** をより深く理解する

一般化した概念を通すと, 一般化する前の概念の本質が理解しやすくなる

グラフの彩色

⇓(一般化)⇓

**グラフの準同型**

⇓(一般化)⇓

制約充足問題

ただし, 制約充足問題はこの講義で扱わない  
(constraint satisfaction problem)

- |   |                       |         |
|---|-----------------------|---------|
| 1 | グラフの彩色と準同型            | (10/5)  |
| 2 | 準同型の基本性質 (1) : 部分構造   | (10/12) |
| 3 | 準同型の基本性質 (2) : 準同型の合成 | (10/19) |
| 4 | グラフの円彩色               | (10/26) |
| 5 | グラフの分数彩色              | (11/2)  |
| 6 | グラフの積と準同型             | (11/9)  |
| 7 | 頂点可移性と準同型             | (11/16) |
| ★ | 調布祭片付け のため 休み         | (11/23) |
| 8 | グラフの商と引き込み            | (11/30) |

注意：予定の変更もありうる

- ★ 国内出張 のため 休み (12/7)
- 9 グラフのコア (12/14)
- 10 準同型が導く半順序 (1) : 構成 (12/21)
- 11 準同型が導く半順序 (2) : 構造 (1/4)
- 12 アルゴリズム (1) : 例 (1/11)
- 13 アルゴリズム (2) : 整合性 (1/18)
- 14 アルゴリズム (3) : 双対性 (1/25)
- ★ 予備 (2/8)

注意 : 予定の変更もありうる

## 教員

- ▶ 岡本 吉央 (おかもと よしお)
- ▶ 居室 : 西 4 号館 2 階 206 号室
- ▶ E-mail : [okamotoy@uec.ac.jp](mailto:okamotoy@uec.ac.jp)
- ▶ Web : <http://dopal.cs.uec.ac.jp/okamotoy/>

## 講義資料

- ▶ Web : <http://dopal.cs.uec.ac.jp/okamotoy/lect/2021/hom/>
- ▶ 注意 1 : 資料の印刷等は各学生が自ら行う
- ▶ 注意 2 : 講義前日の夜 22 時までに, ここに置かれる

<http://dopal.cs.uec.ac.jp/okamotoy/lect/2021/hom/>

- ▶ スライド
- ▶ 印刷用スライド : 8 枚のスライドを 1 ページに収めたもの

### 講義 (85 分)

- ▶ スライドを進める
- ▶ 質問は CommentScreen で  
(CommentScreen の URL は Google Classroom で通知)

### 退室 (5 分) ←重要

- ▶ コメント (授業の感想, 質問など) を Google Forms で提出する
- ▶ コメントとそれに対する回答は (匿名で) 講義ページに掲載される

### オフィスアワー (アポイントメントによる)

- ▶ 質問など



## 評価

2回のレポート **のみ** による

- ▶ レポート 1 (50 点満点)
  - ▶ 要項説明 : 11 月 23 日 (火)
  - ▶ 提出締切 : 12 月 8 日 (水)
- ▶ レポート 2 (50 点満点)
  - ▶ 要項説明 : 1 月 18 日 (火)
  - ▶ 提出締切 : 2 月 9 日 (水)

## 成績

レポート 1 の素点 + レポート 2 の素点 (100 点満点)

## 教科書

- ▶ 指定しない

## 全般的な参考書

- ▶ P. Hell and J. Nešetřil, Graphs and Homomorphisms, Oxford University Press, 2004.
- ▶ C. Godsil and G. Royle, Algebraic Graph Theory, Springer, 2001.
- ▶ G. Hahn and C. Tardif, Graph Homomorphisms: Structure and Symmetry, In: G. Hahn and G. Sabidussi (eds.) “Graph Symmetry”, pp. 107–166, 1997.
- ▶ M. Bodirsky, Graph Homomorphisms and Universal Algebra Course Notes, TU Dresden, 2021.

<https://wwwpub.zih.tu-dresden.de/~bodirsky/Graph-Homomorphisms.pdf>

## その他, 研究論文

### 今日の目標

- ▶ グラフの準同型の定義を理解し、  
関連する概念との違いを述べられる
- ▶ グラフの準同型とグラフの彩色の関係を述べられる

- ① グラフの彩色
- ② グラフの準同型
- ③ 準同型と関連する概念
- ④ よく使うグラフ
- ⑤ 自習 : 有向グラフの準同型・同型
- ⑥ 準同型と彩色
- ⑦ 今日のまとめ と 次回の予告

## 定義：無向グラフとは？

**無向グラフ** とは, 順序対  $(V, E)$  で,

- ▶  $V$  は集合
- ▶  $E$  は  $V$  の 要素数 2 の部分集合の集合

であるもののこと

例：

- ▶  $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- ▶  $E = \{\{1, 2\}, \{1, 5\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}\}$


## 注意

$$\{2, 5\} = \{5, 2\}$$

(集合では順序を不問)

この授業において,  $V$  は常に有限集合

- ▶  $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- ▶  $E = \{\{1, 2\}, \{1, 5\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}\}$




無向グラフ  $G = (V, E)$

## 無向グラフの用語




- ▶  $V$  の要素を  $G$  の **頂点** と呼ぶ
- ▶  $E$  の要素を  $G$  の **辺** と呼ぶ
- ▶  $V$  を  $G$  の **頂点集合** と呼ぶ
- ▶  $E$  を  $G$  の **辺集合** と呼ぶ
- ▶ 辺  $\{u, v\} \in E$  に対して,  $u, v$  をその **端点** と呼ぶ
- ▶ 頂点  $v$  が辺  $e$  の端点であるとき,  $v$  は  $e$  に **接続** するという
- ▶ 頂点  $u$  と  $v$  が辺を成すとき,  $u$  と  $v$  は **隣接** するという

- ▶  $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- ▶  $E = \{\{1, 2\}, \{1, 5\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}\}$
- ▶ 頂点 2, 3 は辺  $\{2, 3\}$  の端点
- ▶ 頂点 2 は辺  $\{2, 3\}$  に接続する
- ▶ 頂点 2 と頂点 3 は隣接する



## 1つのグラフに対するいろいろな図示

- ▶  $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- ▶  $E = \{\{1, 2\}, \{1, 4\}, \{1, 6\}, \{2, 3\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{3, 6\}, \{4, 5\}, \{5, 6\}\}$






## 無向グラフ $G$

### 記法

- ▶  $V(G) = G$  の頂点集合
- ▶  $E(G) = G$  の辺集合


- ▶  $V(G) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- ▶  $E(G) = \{\{1, 2\}, \{1, 5\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}\}$




無向グラフ  $G = (V, E)$

定義：彩色とは？ (直感的な定義)

$G$  の **彩色** (さいしよく, coloring) とは,  
 $G$  の頂点への色の割当てで、各辺の両端点の色が異なるもの



彩色である




彩色ではない

同じ色を持つ頂点の集合を **彩色クラス** (color class) と呼ぶ


無向グラフ  $G = (V, E)$ , 自然数  $k$

定義：彩色とは？ (形式的な定義)

$G$  の  $k$  彩色 ( $k$ -coloring) とは, 写像  $c: V \rightarrow \{1, \dots, k\}$  で, 任意の辺  $\{u, v\} \in E$  に対して  $c(u) \neq c(v)$  を満たすもの



3 彩色である




3 彩色ではない

無向グラフ  $G = (V, E)$ , 自然数  $k$


定義：彩色可能性とは？

$G$  が  $k$  彩色可能 ( $k$ -colorable) であるとは,  $G$  の  $k$  彩色が存在すること

このグラフは 3 彩色可能である



3 彩色である



2 彩色は存在しない


注： $G$  が  $k$  彩色可能  $\Rightarrow G$  は  $k + 1$  彩色可能

無向グラフ  $G = (V, E)$


定義：染色数とは？

$G$  の **染色数** (chromatic number) とは,  
 $G$  の  $k$  彩色が存在するような最小の  $k$

$G$  の染色数を  $\chi(G)$  で表す つまり、 $\chi(G) = \min\{k \mid G \text{ は } k \text{ 彩色可能}\}$



3 彩色である



2 彩色は存在しない

∴ このグラフの染色数は 3



- ① グラフの彩色
- ② グラフの準同型
- ③ 準同型と関連する概念
- ④ よく使うグラフ
- ⑤ 自習：有向グラフの準同型・同型
- ⑥ 準同型と彩色
- ⑦ 今日のまとめ と 次回の予告

## 無向グラフ $G, H$

### 定義：準同型写像とは？

$G$  から  $H$  への **準同型写像** (homomorphism) とは、写像  $f: V(G) \rightarrow V(H)$  で、次を満たすもの

$$\{u, v\} \in E(G) \Rightarrow \{f(u), f(v)\} \in E(H)$$




$$f: \begin{array}{ll} 1 & \mapsto c \\ 2 & \mapsto d \\ 3 & \mapsto c \\ 4 & \mapsto a \\ 5 & \mapsto b \end{array}$$

## 無向グラフ $G, H$

### 定義：準同型写像とは？

$G$  から  $H$  への **準同型写像** (homomorphism) とは、  
写像  $f: V(G) \rightarrow V(H)$  で、次を満たすもの




$$\{u, v\} \in E(G) \Rightarrow \{f(u), f(v)\} \in E(H)$$



$$\begin{aligned}
 1 &\mapsto c \\
 2 &\mapsto d \\
 f: 3 &\mapsto c \\
 4 &\mapsto a \\
 5 &\mapsto b
 \end{aligned}$$



# グラフの準同型写像：思い描くための方法



無向グラフ  $G, H$



## 記法

$G$  から  $H$  への準同型写像が存在するとき、次のように書くことがある


$$G \rightarrow H$$

$G$  から  $H$  への準同型写像が存在しないとき、次のように書くことがある

$$G \not\rightarrow H$$



より詳細な関係は、後で述べる



より詳細な関係は、後で述べる


- ① グラフの彩色
- ② グラフの準同型
- ③ 準同型と関連する概念
- ④ よく使うグラフ
- ⑤ 自習：有向グラフの準同型・同型
- ⑥ 準同型と彩色
- ⑦ 今日のまとめ と 次回の予告

無向グラフ  $G, H$ 

定義：同型写像とは？

$G$  から  $H$  への **同型写像** (isomorphism) とは、  
**全単射**  $f: V(G) \rightarrow V(H)$  で、次を満たすもの

$$\{u, v\} \in E(G) \iff \{f(u), f(v)\} \in E(H)$$



無向グラフ  $G, H$

定義：準同型写像とは？（復習）

$G$  から  $H$  への **準同型写像** (homomorphism) とは、  
写像  $f: V(G) \rightarrow V(H)$  で、次を満たすもの

$$\{u, v\} \in E(G) \Rightarrow \{f(u), f(v)\} \in E(H)$$

定義：同型写像とは？（復習）

$G$  から  $H$  への **同型写像** (isomorphism) とは、  
**全単射**  $f: V(G) \rightarrow V(H)$  で、次を満たすもの

$$\{u, v\} \in E(G) \Leftrightarrow \{f(u), f(v)\} \in E(H)$$

定義：同型写像とは？ (復習)

$G$  から  $H$  への **同型写像** (isomorphism) とは、  
**全単射**  $f: V(G) \rightarrow V(H)$  で、次を満たすもの

$$\{u, v\} \in E(G) \iff \{f(u), f(v)\} \in E(H)$$

同型写像の間違った定義 (1)

**写像**  $f: V(G) \rightarrow V(H)$  で、次を満たすもの

$$\{u, v\} \in E(G) \iff \{f(u), f(v)\} \in E(H)$$



## 同型写像を次のように間違えて定義したら どうなるか？ (1)

定義：同型写像とは？ (復習)


$G$  から  $H$  への **同型写像** (isomorphism) とは、  
**全単射**  $f: V(G) \rightarrow V(H)$  で、次を満たすもの

$$\{u, v\} \in E(G) \iff \{f(u), f(v)\} \in E(H)$$

同型写像の間違った定義 (1)

**写像**  $f: V(G) \rightarrow V(H)$  で、次を満たすもの

$$\{u, v\} \in E(G) \iff \{f(u), f(v)\} \in E(H)$$



定義：同型写像とは？ (復習)

$G$  から  $H$  への **同型写像** (isomorphism) とは、  
**全単射**  $f: V(G) \rightarrow V(H)$  で、次を満たすもの

$$\{u, v\} \in E(G) \iff \{f(u), f(v)\} \in E(H)$$

同型写像の間違った定義 (2)

**全単射**  $f: V(G) \rightarrow V(H)$  で、次を満たすもの

$$\{u, v\} \in E(G) \Rightarrow \{f(u), f(v)\} \in E(H)$$

## 同型写像を次のように間違えて定義したら どうなるか？ (2)

定義：同型写像とは？ (復習)



$G$  から  $H$  への **同型写像** (isomorphism) とは、  
**全単射**  $f: V(G) \rightarrow V(H)$  で、次を満たすもの

$$\{u, v\} \in E(G) \iff \{f(u), f(v)\} \in E(H)$$

同型写像の間違った定義 (2)

**全単射**  $f: V(G) \rightarrow V(H)$  で、次を満たすもの

$$\{u, v\} \in E(G) \Rightarrow \{f(u), f(v)\} \in E(H)$$



無向グラフ  $G, H$

### 記法

$G$  から  $H$  への同型写像が存在するとき、次のように書くことがある

$$G \simeq H$$

$G$  から  $H$  への同型写像が存在しないとき、次のように書くことがある

$$G \not\simeq H$$


$G \simeq H$  であるとき、 $G$  と  $H$  は **同型** であるという

### 直感

$G$  と  $H$  が同型 =  $G$  と  $H$  の見た目は同じ


無向グラフ  $G$ 

定義：自己同型写像とは？

 $G$  の **自己同型写像** (automorphism) とは,  
 $G$  から  $G$  への同型写像のこと

無向グラフ  $G$ 

定義：自己準同型写像とは？

 $G$  の **自己準同型写像** (endomorphism) とは,  
 $G$  から  $G$  への準同型写像のこと

$$f: \begin{array}{l} 1 \mapsto 4 \\ 2 \mapsto 5 \\ 3 \mapsto 4 \\ 4 \mapsto 1 \\ 5 \mapsto 5 \end{array}$$

- ① グラフの彩色
- ② グラフの準同型
- ③ 準同型と関連する概念
- ④ よく使うグラフ
- ⑤ 自習：有向グラフの準同型・同型
- ⑥ 準同型と彩色
- ⑦ 今日のまとめ と 次回の予告


自然数  $n \geq 1$

定義：完全グラフとは？

頂点数  $n$  の **完全グラフ** (complete graph) とは、次のグラフ  $G = (V, E)$  と同型なグラフである

- ▶  $V = \{1, 2, \dots, n\}$
- ▶  $E = \{\{i, j\} \mid i, j \in V, i \neq j\}$

頂点数  $n$  の完全グラフを  $K_n$  で表す






自然数  $n \geq 1$

### 定義：道とは？

頂点数  $n$  の **道** (path) とは、  
次のグラフ  $G = (V, E)$  と同型なグラフである

- ▶  $V = \{1, 2, \dots, n\}$
- ▶  $E = \{\{i, i + 1\} \mid i \in \{1, 2, \dots, n - 1\}\}$

頂点数  $n$  の道を  $P_n$  で表す



辺数  $n - 1$  を道の**長さ** (length) と呼ぶ

自然数  $n \geq 3$

定義：閉路とは？


頂点数  $n$  の **閉路** (cycle) とは、  
次のグラフ  $G = (V, E)$  と同型なグラフである

- ▶  $V = \{1, 2, \dots, n\}$
- ▶  $E = \{\{i, i+1\} \mid i \in \{1, 2, \dots, n-1\}\} \cup \{\{1, n\}\}$

頂点数  $n$  の閉路を  $C_n$  で表す




$C_3$




$C_4$




$C_5$




$C_6$



$C_7$



$C_8$



$C_9$

辺数  $n$  を閉路の**長さ** (length) と呼ぶ

## 定義：有向グラフとは？

**有向グラフ** とは, 順序対  $(V, A)$  で,

- ▶  $V$  は集合
- ▶  $A \subseteq V \times V$  は  $V$  の順序対の集合

であるもののこと

例：

- ▶  $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- ▶  $A = \{(1, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (5, 1), (5, 2)\}$


## 注意

$(2, 5) \neq (5, 2)$

(順序対では順序が大事)

この授業において,  $V$  は常に有限集合

- ▶  $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- ▶  $A = \{(1, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (5, 1), (5, 2)\}$




有向グラフ  $G = (V, A)$ 

## 有向グラフの用語

- ▶  $V$  の要素を  $G$  の頂点と呼ぶ
- ▶  $V$  を  $G$  の頂点集合と呼ぶ
- ▶ 弧  $(u, v) \in A$  に対して,  $u$  はその始点であり,  $v$  はその終点である
- ▶  $A$  の要素を  $G$  の弧と呼ぶ
- ▶  $A$  を  $G$  の弧集合と呼ぶ

- ▶  $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- ▶  $A = \{(1, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (5, 1), (5, 2)\}$
- ▶ 頂点 2 は弧  $(2, 3)$  の始点, 頂点 3 は弧  $(2, 3)$  の終点




有向グラフ  $G$ 

## 記法

- ▶  $V(G) = G$  の頂点集合
- ▶  $A(G) = G$  の弧集合

- ▶  $V(G) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- ▶  $A(G) = \{(1, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (5, 1), (5, 2)\}$




自然数  $n \geq 1$

定義：有向道とは？

頂点数  $n$  の **有向道** (directed path) とは、  
次のグラフ  $G = (V, A)$  と同型なグラフである

- ▶  $V = \{1, 2, \dots, n\}$
- ▶  $A = \{(i, i+1) \mid i \in \{1, 2, \dots, n-1\}\}$

頂点数  $n$  の有向道を  $\vec{P}_n$  で表す



弧数  $n - 1$  を道の**長さ** (length) と呼ぶ

自然数  $n \geq 1$

定義：有向閉路とは？

頂点数  $n$  の **有向閉路** (directed cycle) とは、次のグラフ  $G = (V, A)$  と同型なグラフである

- ▶  $V = \{1, 2, \dots, n\}$
- ▶  $A = \{(i, i+1) \mid i \in \{1, 2, \dots, n-1\}\} \cup \{(1, n)\}$


頂点数  $n$  の有向閉路を  $\vec{C}_n$  で表す




$\vec{C}_1$




$\vec{C}_2$




$\vec{C}_3$




$\vec{C}_4$



$\vec{C}_5$



$\vec{C}_6$



$\vec{C}_7$

弧数  $n$  を閉路の**長さ** (length) と呼ぶ



自然数  $n \geq 1$

定義：推移的トーナメントとは？

頂点数  $n$  の **推移的トーナメント** (transitive tournament) とは、次のグラフ  $G = (V, A)$  と同型なグラフである

- ▶  $V = \{1, 2, \dots, n\}$
- ▶  $A = \{(i, j) \mid i, j \in V, i < j\}$


頂点数  $n$  の推移的トーナメントを  $\vec{T}_n$  で表す




$\vec{T}_3$



$\vec{T}_4$



$\vec{T}_5$



$\vec{T}_6$

- ① グラフの彩色
- ② グラフの準同型
- ③ 準同型と関連する概念
- ④ よく使うグラフ
- ⑤ 自習：有向グラフの準同型・同型
- ⑥ 準同型と彩色
- ⑦ 今日のまとめ と 次回の予告

有向グラフ  $G, H$ 

定義：準同型写像とは？

$G$  から  $H$  への **準同型写像** (homomorphism) とは、  
写像  $f: V(G) \rightarrow V(H)$  で、次を満たすもの

$$(u, v) \in A(G) \Rightarrow (f(u), f(v)) \in A(H)$$

$G$  から  $H$  への準同型写像が存在するとき、次のように書くことがある

$$G \rightarrow H$$

$G$  から  $H$  への準同型写像が存在しないとき、次のように書くことがある

$$G \not\rightarrow H$$

有向グラフ  $G, H$ 

## 定義：同型写像とは？

$G$  から  $H$  への **同型写像** (isomorphism) とは、  
全単射  $f: V(G) \rightarrow V(H)$  で、次を満たすもの

$$(u, v) \in A(G) \iff (f(u), f(v)) \in A(H)$$

$G$  から  $H$  への同型写像が存在するとき、次のように書くことがある

$$G \simeq H$$



$G$  から  $H$  への同型写像が存在しないとき、次のように書くことがある

$$G \not\simeq H$$

- ① グラフの彩色
- ② グラフの準同型
- ③ 準同型と関連する概念
- ④ よく使うグラフ
- ⑤ 自習：有向グラフの準同型・同型
- ⑥ 準同型と彩色
- ⑦ 今日のまとめ と 次回の予告

無向グラフ  $G$ , 自然数  $k \geq 1$ 


性質：準同型と彩色

 $G$  が  $k$  彩色可能  $\Leftrightarrow G \rightarrow K_k$ 

無向グラフ  $G$ , 自然数  $k \geq 1$ 

性質：準同型と彩色

$$G \text{ が } k \text{ 彩色可能} \Leftrightarrow G \rightarrow K_k$$



無向グラフ  $G$ , 自然数  $k \geq 1$

性質：準同型と彩色

$$G \text{ が } k \text{ 彩色可能} \iff G \rightarrow K_k$$

「 $\Rightarrow$ 」の証明： $G$  が  $k$  彩色可能であると仮定

- ▶  $k$  彩色  $c: V(G) \rightarrow \{1, 2, \dots, k\}$  が存在
- ▶ つまり, 任意の辺  $\{u, v\} \in E(G)$  に対して,  $c(u) \neq c(v)$
- ▶  $V(K_k) = \{1, 2, \dots, k\}$  として, 写像  $f: V(G) \rightarrow V(K_k)$  を次で定義

$$\text{任意の } v \in V(G) \text{ に対して, } f(v) = c(v)$$

- ▶ このとき,  $f$  は  $G$  から  $K_k$  への準同型写像
  - ▶  $\{u, v\} \in E(G)$  のとき,  $c(u) \neq c(v)$  なので,  
 $\{c(u), c(v)\} \in E(K_k)$

□



無向グラフ  $G$ , 自然数  $k \geq 1$

性質：準同型と彩色

$$G \text{ が } k \text{ 彩色可能} \iff G \rightarrow K_k$$

「 $\Leftarrow$ 」の証明：準同型写像  $f: V(G) \rightarrow V(K_k)$  が存在すると仮定

- ▶  $V(K_k) = \{1, 2, \dots, k\}$  とする
- ▶ このとき,  $f$  は  $G$  の  $k$  彩色
  - ▶  $\{u, v\} \in E(G)$  のとき,  $\{f(u), f(v)\} \in E(K_k)$  なので,  
 $f(u) \neq f(v)$




無向グラフ  $G$ 

性質：準同型と染色数


$$\chi(G) = \min\{k \mid G \rightarrow K_k\}$$

染色数の定義と前述の性質から、ただちに分かる



グラフ  $G, H$ 

定義：H 彩色とは？

 $G$  の **H 彩色** (H-coloring) とは、 $G$  から  $H$  への準同型写像のこと

つまり、

- ▶ 普通の意味での  $k$  彩色 = 上の意味での  $K_k$  彩色
- ▶  $H$  は完全グラフでなくてもよい
- ▶  $G, H$  は有向グラフであってもよい

∴ H 彩色は、普通の意味での彩色の一般化

## 無向グラフ $H$

定義：  $H$  彩色問題とは？

- ▶ **入力**：無向グラフ  $G$
- ▶ **出力**：  $G \rightarrow H$  ならば, Yes  
 $G \not\rightarrow H$  ならば, No

次の定理は、グラフ準同型の歴史においてとても重要な定理

定理：  $H$  彩色問題に対する二分定理 (dichotomy theorem)

(Hell, Nešetřil, '90)

$H$  彩色問題は

- ▶  $H$  が二部グラフである  $\Rightarrow$  多項式時間で解ける
- ▶ そうでない  $\Rightarrow$  NP 完全である

$H$  が有向グラフである場合、話がもっとややこしい

- ① グラフの彩色
- ② グラフの準同型
- ③ 準同型と関連する概念
- ④ よく使うグラフ
- ⑤ 自習：有向グラフの準同型・同型
- ⑥ 準同型と彩色
- ⑦ 今日のまとめ と 次回の予告

### 今日の目標

- ▶ グラフの準同型の定義を理解し、関連する概念との違いを述べられる
- ▶ グラフの準同型とグラフの彩色の関係を述べられる

### 次回予告

準同型の存在性・非存在性を証明するための技法を学ぶ

- ▶ 着眼点 1 : 奇内周
- ▶ 着眼点 2 : 独立比
- ▶ (着眼点 3 : 双対性)

- ① グラフの彩色
- ② グラフの準同型
- ③ 準同型と関連する概念
- ④ よく使うグラフ
- ⑤ 自習：有向グラフの準同型・同型
- ⑥ 準同型と彩色
- ⑦ 今日のまとめ と 次回の予告