

# 離散最適化基礎論 第 2 回

準同型の基本性質 (1) : 部分構造

岡本 吉央

okamotoy@uec.ac.jp

電気通信大学

2021 年 10 月 12 日

最終更新 : 2021 年 10 月 13 日 13:41

- |   |                       |         |
|---|-----------------------|---------|
| 1 | グラフの彩色と準同型            | (10/5)  |
| 2 | 準同型の基本性質 (1) : 部分構造   | (10/12) |
| 3 | 準同型の基本性質 (2) : 準同型の合成 | (10/19) |
| 4 | グラフの円彩色               | (10/26) |
| 5 | グラフの分数彩色              | (11/2)  |
| 6 | グラフの積と準同型             | (11/9)  |
| 7 | 頂点可移性と準同型             | (11/16) |
| ★ | 調布祭片付け のため 休み         | (11/23) |
| 8 | グラフの商と引き込み            | (11/30) |

注意：予定の変更もありうる

- ★ 国内出張 のため 休み (12/7)
- 9 グラフのコア (12/14)
- 10 準同型が導く半順序 (1) : 構成 (12/21)
- 11 準同型が導く半順序 (2) : 構造 (1/4)
- 12 アルゴリズム (1) : 例 (1/11)
- 13 アルゴリズム (2) : 整合性 (1/18)
- 14 アルゴリズム (3) : 双対性 (1/25)
- ★ 予備 (2/8)


注意 : 予定の変更もありうる

## 無向グラフ $G, H$

定義：準同型写像とは？

$G$  から  $H$  への **準同型写像** (homomorphism) とは、  
写像  $f: V(G) \rightarrow V(H)$  で、次を満たすもの

$$\{u, v\} \in E(G) \Rightarrow \{f(u), f(v)\} \in E(H)$$




$$\begin{aligned}
 f: & \quad 1 \mapsto c \\
 & \quad 2 \mapsto d \\
 & \quad 3 \mapsto c \\
 & \quad 4 \mapsto a \\
 & \quad 5 \mapsto b
 \end{aligned}$$

無向グラフ  $G, H$ 

定義：同型写像とは？

$G$  から  $H$  への **同型写像** (isomorphism) とは、  
**全単射**  $f: V(G) \rightarrow V(H)$  で、次を満たすもの

$$\{u, v\} \in E(G) \iff \{f(u), f(v)\} \in E(H)$$



**注**：同型写像は準同型写像

## グラフ $G, H$

### 記法

$G$  から  $H$  への準同型写像が存在するとき、次のように書くことがある

$$G \rightarrow H$$

$G$  から  $H$  への同型写像が存在するとき、次のように書くことがある

$$G \simeq H$$

### 注意

- ▶ 以後、単に「グラフ」と書いたら、無向グラフと有向グラフの両方を指す
- ▶ 区別が必要な場合は「無向グラフ」、「有向グラフ」と書く

### 今日の目標

準同型の存在性・非存在性を証明するための技法を使えるようになる

- ▶ 着眼点 1 : 奇内周
- ▶ 着眼点 2 : 独立比 (非準同型補題)


- ① 準同型の合成
- ② 部分グラフ
- ③ 奇内周
- ④ 非準同型補題
- ⑤ 非準同型補題：証明
- ⑥ 今日のまとめ と 次回の予告



グラフ  $G, H, K$

性質：準同型の合成も準同型

$\left. \begin{array}{l} f \text{ が } G \text{ から } H \text{ への準同型} \\ g \text{ が } H \text{ から } K \text{ への準同型} \end{array} \right\} \Rightarrow g \circ f \text{ は } G \text{ から } K \text{ への準同型}$




**注**：合成の定義  $\rightarrow (g \circ f)(v) = g(f(v))$

グラフ  $G, H, K$

性質：準同型の合成も準同型

$\left. \begin{array}{l} f \text{ が } G \text{ から } H \text{ への準同型} \\ g \text{ が } H \text{ から } K \text{ への準同型} \end{array} \right\} \Rightarrow g \circ f \text{ は } G \text{ から } K \text{ への準同型}$




**注**：合成の定義  $\rightarrow (g \circ f)(v) = g(f(v))$

グラフ  $G, H, K$

性質：準同型の合成も準同型

$f$  が  $G$  から  $H$  への準同型  
 $g$  が  $H$  から  $K$  への準同型
 }  $\Rightarrow g \circ f$  は  $G$  から  $K$  への準同型



**注**：合成の定義  $\rightarrow (g \circ f)(v) = g(f(v))$

証明：  $f$  が  $G$  から  $H$  への準同型，  $g$  が  $H$  から  $K$  への準同型であると仮定

▶ つまり，

$$\{u, v\} \in E(G) \Rightarrow \{f(u), f(v)\} \in E(H) \quad (\text{A})$$

$$\{x, y\} \in E(H) \Rightarrow \{g(x), g(y)\} \in E(K) \quad (\text{B})$$

▶ 証明すべきことは，  $g \circ f$  が  $G$  から  $K$  への準同型であること， つまり

$$\{u, v\} \in E(G) \Rightarrow \{(g \circ f)(u), (g \circ f)(v)\} \in E(K)$$

▶  $\{u, v\} \in E(G)$  と仮定

▶

$$\{(g \circ f)(u), (g \circ f)(v)\} \in E(K)$$

### 前のページの復習

$$\{u, v\} \in E(G) \Rightarrow \{f(u), f(v)\} \in E(H) \quad (\text{A})$$

$$\{x, y\} \in E(H) \Rightarrow \{g(x), g(y)\} \in E(K) \quad (\text{B})$$

- ▶  $\{u, v\} \in E(G)$  と仮定
- ▶ このとき, (A) より,  $\{f(u), f(v)\} \in E(H)$
  
- ▶  $\{(g \circ f)(u), (g \circ f)(v)\} \in E(K)$

### 前のページの復習

$$\{u, v\} \in E(G) \Rightarrow \{f(u), f(v)\} \in E(H) \quad (\text{A})$$

$$\{x, y\} \in E(H) \Rightarrow \{g(x), g(y)\} \in E(K) \quad (\text{B})$$

- ▶  $\{u, v\} \in E(G)$  と仮定
- ▶ このとき, (A) より,  $\{f(u), f(v)\} \in E(H)$
- ▶ (B) において,  $x = f(u), y = f(v)$  とすると,  $\{g(f(u)), g(f(v))\} \in E(K)$
- ▶  $\{(g \circ f)(u), (g \circ f)(v)\} \in E(K)$

## 前のページの復習

$$\{u, v\} \in E(G) \Rightarrow \{f(u), f(v)\} \in E(H) \quad (\text{A})$$

$$\{x, y\} \in E(H) \Rightarrow \{g(x), g(y)\} \in E(K) \quad (\text{B})$$

- ▶  $\{u, v\} \in E(G)$  と仮定
- ▶ このとき, (A) より,  $\{f(u), f(v)\} \in E(H)$
- ▶ (B) において,  $x = f(u), y = f(v)$  とすると,  $\{g(f(u)), g(f(v))\} \in E(K)$
- ▶  $\{g(f(u)), g(f(v))\} = \{(g \circ f)(u), (g \circ f)(v)\}$  なので,  $\{(g \circ f)(u), (g \circ f)(v)\} \in E(K)$



有向グラフの場合も同様に証明できる

### 前のページの復習

$$\{u, v\} \in E(G) \Rightarrow \{f(u), f(v)\} \in E(H) \quad (\text{A})$$

$$\{x, y\} \in E(H) \Rightarrow \{g(x), g(y)\} \in E(K) \quad (\text{B})$$



グラフ  $G, H, K$

性質：準同型の合成も準同型

$f$  が  $G$  から  $H$  への準同型  
 $g$  が  $H$  から  $K$  への準同型 }  $\Rightarrow g \circ f$  は  $G$  から  $K$  への準同型

グラフ  $G, H, K$

性質：準同型の合成も準同型

$f$  が  $G$  から  $H$  への準同型  
 $g$  が  $H$  から  $K$  への準同型 }  $\Rightarrow g \circ f$  は  $G$  から  $K$  への準同型

性質：準同型の合成も準同型 (別の表現)

$G \rightarrow H$  かつ  $H \rightarrow K \Rightarrow G \rightarrow K$

「別の表現」の視点を次回の講義で深める


- ① 準同型の合成
- ② 部分グラフ
- ③ 奇内周
- ④ 非準同型補題
- ⑤ 非準同型補題：証明
- ⑥ 今日のまとめ と 次回の予告

無向グラフ  $G, H$ 

## 定義：部分グラフとは？

$G$  が  $H$  の **部分グラフ** (subgraph) であるとは、  
 $V(G) \subseteq V(H)$  かつ  $E(G) \subseteq E(H)$  が成り立つこと

$G$  が  $H$  の部分グラフであることを「 $G \subseteq H$ 」と表記し、  
 $H$  が  $G$  を含むともいう




有向グラフにおける部分グラフも同様に定義される

グラフ  $G, H$

性質：部分グラフと準同型


$$G \subseteq H \Rightarrow G \rightarrow H$$



グラフ  $G, H$


性質：部分グラフと準同型

$$G \subseteq H \Rightarrow G \rightarrow H$$



証明 :  $G \subseteq H$  であると仮定 (注 :  $V(G) \subseteq V(H)$ )

- ▶ 写像  $f: V(G) \rightarrow V(H)$  として,  $f(v) = v (\forall v \in V(G))$  を考える
- ▶ このとき,  $\{u, v\} \in E(G)$  ならば,  $\{u, v\} \in E(H)$  ( $\because G \subseteq H$ )
- ▶  $\therefore f$  は  $G$  から  $H$  への準同型写像 □



正整数  $n, m$ 



## 性質：完全グラフと準同型

- 1  $n \leq m \Rightarrow K_n \rightarrow K_m$
- 2  $n > m \Rightarrow K_n \not\rightarrow K_m$

証明：

- 1  $n \leq m$  のとき,  $K_n$  は  $K_m$  の部分グラフ (と同型)
- 2 次のページ



□






証明 (続き) :  $n > m$  とし, 任意の写像  $f: V(K_n) \rightarrow V(K_m)$  を考える

- ▶  $n > m$  なので, ある 2 頂点  $u, v \in V(K_n)$  に対して,  $f(u) = f(v)$
- ▶ このとき,  $\{u, v\} \in E(K_n)$  であるが,  $\{f(u), f(v)\} \notin E(K_m)$
- ▶ したがって,  $f$  は準同型写像にならない □



証明 (続き) :  $n > m$  とし, 任意の写像  $f: V(K_n) \rightarrow V(K_m)$  を考える

- ▶  $n > m$  なので, ある 2 頂点  $u, v \in V(K_n)$  に対して,  $f(u) = f(v)$
- ▶ このとき,  $\{u, v\} \in E(K_n)$  であるが,  $\{f(u), f(v)\} \notin E(K_m)$
- ▶ したがって,  $f$  は準同型写像にならない




正整数  $n, m$ 

性質：完全グラフと準同型

$$1 \quad n \leq m \Rightarrow K_n \rightarrow K_m$$

$$2 \quad n > m \Rightarrow K_n \not\rightarrow K_m$$

$$K_1 \not\rightarrow K_2 \not\rightarrow K_3 \not\rightarrow K_4 \not\rightarrow \cdots \not\rightarrow K_n \not\rightarrow \cdots$$




「矢印が一方向」に向かう無向グラフの無限列が得られる

## 無向グラフ $G$

定義：二部グラフとは？

$G$  が **二部グラフ** (bipartite graph) であるとは、  
 $G$  から  $K_2$  への準同型写像が存在すること

「 $G \rightarrow K_2$  を満たす  $G$  が二部グラフ」ということ




つまり、 $G$  が二部グラフであるとは、 $G$  が 2 彩色可能であること

## 無向グラフ $G$

定義：二部グラフとは？

$G$  が **二部グラフ** (bipartite graph) であるとは、  
 $G$  から  $K_2$  への準同型写像が存在すること

「 $G \rightarrow K_2$  を満たす  $G$  が二部グラフ」ということ




つまり、 $G$  が二部グラフであるとは、 $G$  が 2 彩色可能であること

## 無向グラフ $G$


定義：二部グラフとは？


$G$  が **二部グラフ** (bipartite graph) であるとは、  
 $G$  から  $K_2$  への準同型写像が存在すること

「 $G \rightarrow K_2$  を満たす  $G$  が二部グラフ」ということ




つまり、 $G$  が二部グラフであるとは、 $G$  が 2 彩色可能であること









定義：奇閉路とは？

**奇閉路** (odd cycle) とは, 長さが奇数の閉路のこと

つまり, 奇閉路とは, ある正整数  $k$  に対する  $C_{2k+1}$  のこと

 $C_3$  $C_5$  $C_7$  $C_9$  $C_{11}$  $C_{13}$  $C_{15}$


無向グラフ  $G$ , 正整数  $k$ 

性質：二部グラフと奇閉路

$$G \text{ が二部グラフ} \Rightarrow C_{2k+1} \not\rightarrow G$$

証明： $C_{2k+1} \rightarrow G$  であると仮定する


- ▶  $G$  が二部グラフなので,  $G \rightarrow K_2$
- ▶ したがって,  $C_{2k+1} \rightarrow K_2$
- ▶  $V(C_{2k+1}) = \{1, 2, \dots, 2k+1\}$ ,  
 $E(C_{2k+1}) = \{\{i, i+1\} \mid i = 1, \dots, 2k\} \cup \{\{2k+1, 1\}\}$  とする
- ▶  $V(K_2) = \{1, 2\}$ ,  $E(K_2) = \{\{1, 2\}\}$  とする



証明 (続き) : 準同型写像  $f: V(C_{2k+1}) \rightarrow V(K_2)$  を考える

- ▶  $f(1) = 1$  とすると,  $f$  は準同型写像なので  
 $f(2) = 2, f(3) = 1, f(4) = 2, \dots, f(2k) = 2, f(2k + 1) = 1$
- ▶ このとき,  $\{2k + 1, 1\} \in E(C_{2k+1})$  であるが,  
 $\{f(2k + 1), f(1)\} = \{1, 1\} \notin E(K_2)$
- ▶ これは  $f$  が準同型写像であることに矛盾
- ▶  $f(1) = 2$  の場合も同様

□




- ① 準同型の合成
- ② 部分グラフ
- ③ 奇内周
- ④ 非準同型補題
- ⑤ 非準同型補題：証明
- ⑥ 今日のまとめ と 次回の予告

無向グラフ  $G$ 

## 定義：歩道とは？

$G$  における **歩道** (walk) とは,  
 $G$  の頂点の有限列  $v_1, v_2, \dots, v_k$  で,  
 $\{v_i, v_{i+1}\} \in E(G) \ (\forall i = 1, 2, \dots, k-1)$  を満たすもの

注：頂点  $v_1, \dots, v_k$  が互いに異なる必要はない



1, 5, 3, 2, 1, 4  
 5, 3, 2



$k-1$  を 歩道の **長さ** と呼ぶ

無向グラフ  $G$ , 正整数  $k$

性質：道の準同型像としての歩道

$$P_k \rightarrow G \Leftrightarrow G \text{ には長さ } k-1 \text{ の歩道がある}$$

準同型の定義を考えれば、直ちに分かる (考えてみよ)




無向グラフ  $G$ , 正整数  $k$

性質：道の準同型像としての歩道

$$P_k \rightarrow G \Leftrightarrow G \text{ には長さ } k-1 \text{ の歩道がある}$$

準同型の定義を考えれば、直ちに分かる (考えてみよ)






無向グラフ  $G$ 

## 定義：閉歩道とは？

$G$  における **閉歩道** (closed walk) とは,  
 $G$  の頂点の有限列  $v_1, v_2, \dots, v_k$  で,  
 $\{v_i, v_{i+1}\} \in E(G)$  ( $\forall i = 1, 2, \dots, k-1$ ) と  $\{v_k, v_1\} \in E(G)$  を満たすもの

注：頂点  $v_1, \dots, v_k$  が互いに異なる必要はない



1, 2, 3, 5, 1, 4, 5, 3, 2, 1, 4

$k$  を閉歩道の **長さ** と呼ぶ

## 補足



$v_1, v_2, \dots, v_k, v_1$  を閉歩道とする場合 (定義) もある

無向グラフ  $G$ , 正整数  $k$

性質：閉路の準同型像としての閉歩道

$$C_k \rightarrow G \Leftrightarrow G \text{ には長さ } k \text{ の閉歩道がある}$$

準同型の定義を考えれば、直ちに分かる (考えてみよ)



無向グラフ  $G$ , 正整数  $k$

性質：奇閉歩道が作る奇閉路


$G$  が長さ  $2k + 1$  の閉歩道を含む  $\Rightarrow G$  は長さ  $2k + 1$  以下の奇閉路を含む

$k$  に関する帰納法で証明できる

二部グラフではない無向グラフ  $G$

定義：奇内周とは？

$G$  の **奇内周** (odd girth) とは,  $G$  が含む**奇閉路**の最短長




奇内周 = 3

**注**：二部グラフに対して, 奇内周は定義されない

二部グラフではない無向グラフ  $G, H$

性質：グラフの奇内周と準同型


$$G \rightarrow H \Rightarrow G \text{ の奇内周} \geq H \text{ の奇内周}$$



証明：準同型写像  $f: V(G) \rightarrow V(H)$  を考える

- ▶  $G$  の奇内周  $= 2k + 1$  とする
- ▶ このとき, 準同型写像  $g: V(C_{2k+1}) \rightarrow V(G)$  が存在する
- ▶ ここで,  $f \circ g$  は  $C_{2k+1}$  から  $H$  への準同型写像
- ▶  $\therefore H$  は長さ  $2k + 1$  の閉歩道を含む
- ▶  $\therefore H$  は長さ  $2k + 1$  以下の奇閉路を含む
- ▶  $\therefore H$  の奇内周  $\leq 2k + 1 = G$  の奇内周


□



証明：準同型写像  $f: V(G) \rightarrow V(H)$  を考える

- ▶  $G$  の奇内周 =  $2k + 1$  とする
- ▶ このとき、準同型写像  $g: V(C_{2k+1}) \rightarrow V(G)$  が存在する
- ▶ ここで、 $f \circ g$  は  $C_{2k+1}$  から  $H$  への準同型写像
- ▶  $\therefore H$  は長さ  $2k + 1$  の閉歩道を含む
- ▶  $\therefore H$  は長さ  $2k + 1$  以下の奇閉路を含む
- ▶  $\therefore H$  の奇内周  $\leq 2k + 1 = G$  の奇内周


□



証明：準同型写像  $f: V(G) \rightarrow V(H)$  を考える

- ▶  $G$  の奇内周 =  $2k + 1$  とする
- ▶ このとき、準同型写像  $g: V(C_{2k+1}) \rightarrow V(G)$  が存在する
- ▶ ここで、 $f \circ g$  は  $C_{2k+1}$  から  $H$  への準同型写像
- ▶  $\therefore H$  は長さ  $2k + 1$  の閉歩道を含む
- ▶  $\therefore H$  は長さ  $2k + 1$  以下の奇閉路を含む
- ▶  $\therefore H$  の奇内周  $\leq 2k + 1 = G$  の奇内周

□






正整数  $k, \ell$

性質：奇閉路間の準同型写像

1  $k \geq \ell \Rightarrow C_{2k+1} \rightarrow C_{2\ell+1}$

2  $k < \ell \Rightarrow C_{2k+1} \not\rightarrow C_{2\ell+1}$



証明の流れ


- 1 実際に準同型写像を 1 つ構成すればよい
- 2 奇内周を比較する

**1** の証明 :  $C_{2k+3} \rightarrow C_{2k+1}$  を証明すれば十分

- ▶  $V(C_n) = \{1, 2, \dots, n\}$ ,  
 $E(G) = \{\{i, i+1\} \mid i = 1, 2, \dots, n-1\} \cup \{\{n+1, 1\}\}$  とする
- ▶ 写像  $f: V(C_{2k+3}) \rightarrow V(C_{2k+1})$  を次のように定義する

$$f(i) = \begin{cases} i & (i = 1, 2, \dots, 2k+1), \\ 2k & (i = 2k+2), \\ 2k+1 & (i = 2k+3) \end{cases}$$


- ▶ このとき,  $f$  は  $C_{2k+3}$  から  $C_{2k+1}$  への準同型写像



**2** の証明： $k < l$  とする

- ▶  $C_{2k+1}$  の奇内周は  $2k + 1$
- ▶  $C_{2l+1}$  の奇内周は  $2l + 1$
- ▶  $k < l$  なので,  $C_{2k+1}$  の奇内周  $<$   $C_{2l+1}$  の奇内周
- ▶  $\therefore C_{2k+1} \not\rightarrow C_{2l+1}$

□



性質：グラフの奇内周と準同型

(復習)


$$G \rightarrow H \Rightarrow G \text{ の奇内周} \geq H \text{ の奇内周}$$

正整数  $k, \ell$ 

性質：奇閉路間の準同型写像

$$1 \quad k \geq \ell \Rightarrow C_{2k+1} \rightarrow C_{2\ell+1}$$

$$2 \quad k < \ell \Rightarrow C_{2k+1} \not\rightarrow C_{2\ell+1}$$




正整数  $k, \ell$ 

性質：奇閉路間の準同型写像

$$1 \quad k \geq \ell \Rightarrow C_{2k+1} \rightarrow C_{2\ell+1}$$

$$2 \quad k < \ell \Rightarrow C_{2k+1} \not\rightarrow C_{2\ell+1}$$



$K_2$  と  $K_3$  の「間」には「稠密」にグラフが存在する → 後の講義で詳しく

- ① 準同型の合成
- ② 部分グラフ
- ③ 奇内周
- ④ 非準同型補題
- ⑤ 非準同型補題：証明
- ⑥ 今日のまとめ と 次回の予告

無向グラフ  $G, H$ 



性質：非準同型補題 (No-homomorphism lemma) (Albertson, Collins '85)

$$\begin{array}{l} G \rightarrow H \\ H \text{ が頂点可移} \end{array} \Rightarrow i(G) \geq i(H)$$

## 無向グラフ $G$


定義：頂点可移グラフとは？

$G$  が **頂点可移** (vertex-transitive) であるとは、  
 任意の2頂点  $u, v \in V(G)$  に対して、  
 $G$  の自己同型写像  $f$  で  $f(u) = v$  を満たすものが存在すること





# 頂点可移グラフ：例




無向グラフ  $G$ 

定義：独立集合とは？

$G$  の **独立集合** (independent set) とは、頂点部分集合  $I \subseteq V(G)$  で、任意の  $u, v \in I$  に対して  $\{u, v\} \notin E(G)$  が成り立つもの

例： $\{1, 4, 8\}$  は独立集合であり、 $\{1, 7, 10\}$  は独立集合でない



**注** :  $I$  が独立集合  $\Rightarrow I$  の部分集合も独立集合

## 無向グラフ $G$

定義：最大独立集合とは？


$G$  の **最大独立集合** (maximum independent set) とは、要素数最大の独立集合のこと

定義：独立数とは？

$G$  の **独立数** (independence number) とは、 $G$  の最大独立集合の要素数のこと

( $\alpha(G)$  で表す)

例： $\{1, 4, 7, 8\}$  は最大独立集合であり、独立数 = 4




無向グラフ  $G$ 

定義：独立比とは？

 $G$  の **独立比** (independence ratio) とは、次の量  $i(G)$  のこと

$$i(G) = \frac{\alpha(G)}{|V(G)|}$$


例：独立数 = 4, 頂点数 = 10 なので、独立比 =  $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$ 

無向グラフ  $G, H$ 

性質：非準同型補題 (No-homomorphism lemma) (Albertson, Collins '85)

$$G \rightarrow H \quad \Rightarrow \quad i(G) \geq i(H)$$

$H$  が頂点可移



正整数  $k, \ell$

性質：奇閉路間の準同型写像


$$\boxed{2} \quad k < \ell \Rightarrow C_{2k+1} \not\rightarrow C_{2\ell+1}$$

証明の流れ

$\boxed{2}$  非準同型補題を用いる

**2** の証明： $k < l$  とする

- ▶  $C_{2\ell+1}$  は頂点可移 (「回転」を考えれば良い)
- ▶ 非準同型補題より,  
 $i(C_{2k+1}) < i(C_{2\ell+1})$  であれば,  $C_{2k+1} \not\rightarrow C_{2\ell+1}$  となる



性質：非準同型補題

(復習)

$$\begin{array}{l}
 G \rightarrow H \\
 H \text{ が頂点可移}
 \end{array}
 \Rightarrow i(G) \geq i(H)$$

2 の証明 (続き)：(仮定： $k < \ell$ )

- ▶ ここで,  $\alpha(C_{2k+1}) = k$  (なぜ?)
- ▶ 同様に,  $\alpha(C_{2\ell+1}) = \ell$
- ▶ したがって,

$$i(C_{2k+1}) = \frac{\alpha(C_{2k+1})}{|V(C_{2k+1})|} = \frac{k}{2k+1} = \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{1}{2k+1} \right)$$

$$i(C_{2\ell+1}) = \frac{\alpha(C_{2\ell+1})}{|V(C_{2\ell+1})|} = \frac{\ell}{2\ell+1} = \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{1}{2\ell+1} \right)$$

- ▶ ゆえに,  $i(C_{2k+1}) < i(C_{2\ell+1})$  □




- ① 準同型の合成
- ② 部分グラフ
- ③ 奇内周
- ④ 非準同型補題
- ⑤ 非準同型補題：証明
- ⑥ 今日のまとめ と 次回の予告

無向グラフ  $G, H$

性質：非準同型補題 (No-homomorphism lemma) (Albertson, Collins '85)

$$G \rightarrow H \quad \Rightarrow \quad i(G) \geq i(H)$$


$H$  が頂点可移





頂点可移グラフ  $H$  をまず考察する

- ▶  $\mathcal{I}(H) = H$  の最大独立集合全体の集合 とする
- ▶  $H$  が頂点可移なので、任意の 2 頂点  $u, v \in V(H)$  に対して、


$u$  を含む最大独立集合の総数 =  $v$  を含む最大独立集合の総数



# 非準同型補題：證明 (1) — 例




▶ したがって,  $\alpha(H) \cdot |\mathcal{I}(H)| = m \cdot |V(H)|$



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
{1, 3, 9, 10}	●		●						●	●
{2, 4, 6, 10}		●		●		●				●
{3, 5, 6, 7}			●		●	●	●			
{1, 4, 7, 8}	●			●			●	●		
{2, 5, 8, 9}		●			●			●	●	


準同型写像  $g: G \rightarrow H$  を考える

- ▶  $I \in \mathcal{I}(H) \Rightarrow g^{-1}(I)$  は  $G$  の独立集合
- ▶  $\therefore \sum_{I \in \mathcal{I}(H)} |g^{-1}(I)| \leq \sum_{I \in \mathcal{I}(H)} \alpha(G) = \alpha(G) \cdot |\mathcal{I}(H)|$



準同型写像  $g: G \rightarrow H$  を考える

- ▶  $I \in \mathcal{I}(H) \Rightarrow g^{-1}(I)$  は  $G$  の独立集合
- ▶  $\therefore \sum_{I \in \mathcal{I}(H)} |g^{-1}(I)| \leq \sum_{I \in \mathcal{I}(H)} \alpha(G) = \alpha(G) \cdot |\mathcal{I}(H)|$



準同型写像  $g: G \rightarrow H$  を考える

▶  $I \in \mathcal{I}(H) \Rightarrow g^{-1}(I)$  は  $G$  の独立集合

▶  $\therefore \sum_{I \in \mathcal{I}(H)} |g^{-1}(I)| \leq \sum_{I \in \mathcal{I}(H)} \alpha(G) = \alpha(G) \cdot |\mathcal{I}(H)|$

▶ 一方で,  $\sum_{I \in \mathcal{I}(H)} |g^{-1}(I)| = m \cdot |V(G)|$

(なぜ?)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
{1, 3, 9, 10}	●		●						●	●
{2, 4, 6, 10}		●		●		●				●
{3, 5, 6, 7}			●		●	●	●			
{1, 4, 7, 8}	●			●			●	●		
{2, 5, 8, 9}		●			●			●	●	
	↑	↑	↑	↑	↑					
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>					
				<i>f</i>	<i>g</i>					



準同型写像  $g: G \rightarrow H$  を考える

- ▶  $I \in \mathcal{I}(H) \Rightarrow g^{-1}(I)$  は  $G$  の独立集合
- ▶  $\therefore \sum_{I \in \mathcal{I}(H)} |g^{-1}(I)| \leq \sum_{I \in \mathcal{I}(H)} \alpha(G) = \alpha(G) \cdot |\mathcal{I}(H)|$
- ▶ 一方で,  $\sum_{I \in \mathcal{I}(H)} |g^{-1}(I)| = m \cdot |V(G)|$  (なぜ?)
- ▶  $\therefore \frac{\alpha(G)}{|V(G)|} \geq \frac{m}{|\mathcal{I}(H)|} = \frac{\alpha(H)}{|V(H)|}$  □

前のページの復習：  $\alpha(H) \cdot |\mathcal{I}(H)| = m \cdot |V(H)|$

- ① 準同型の合成
- ② 部分グラフ
- ③ 奇内周
- ④ 非準同型補題
- ⑤ 非準同型補題：証明
- ⑥ 今日のまとめ と 次回の予告

## 今日の目標

準同型の存在性・非存在性を証明するための技法を使えるようになる

- ▶ 着眼点 1 : 奇内周
- ▶ 着眼点 2 : 独立比 (非準同型補題)

## 次回の予告

準同型写像と同型写像の生み出す二項関係の性質を理解する

- ▶ 準同型写像  $\rightsquigarrow$  擬順序関係
- ▶ 同型写像  $\rightsquigarrow$  同値関係
- ▶ 自己準同型写像  $\rightsquigarrow$  モノイド
- ▶ 自己同型写像  $\rightsquigarrow$  群

- ① 準同型の合成
- ② 部分グラフ
- ③ 奇内周
- ④ 非準同型補題
- ⑤ 非準同型補題：証明
- ⑥ 今日のまとめ と 次回の予告